

## FOLPAN 80 WDG

Composizione

Folpet puro g. 80  
coformulanti q.b. a g. 100

**FRASI DI RISCHIO:** Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

### MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

via ZANICA 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)– Tel. 035 328.811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. - Beer-Sheva 84100 - Israele

U.C.B. - B-9000 Gent - Belgio

Bayer Cropscience SpA - Filago (BG)

**Autorizzazione Ministero della salute n. 8601 del 03.12.1994**

Contenuto: **g 250-500; Kg 1-5-10-20-25** Partita n.



NOCIVO



PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE

# FOLPAN 80 WDG

## Fungicida organico in granuli idrodispersibili

**CARATTERISTICHE:** FOLPAN 80 WDG è un fungicida ad azione principalmente preventiva ed è dotato di notevole persistenza d'azione.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti con 100 lt di acqua, utilizzando pompe a volume normale a meno che sia indicato diversamente

**VITE (UVE DA VINO):** Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) iniziare con un trattamento alla ripresa vegetativa seguito da un altro quando si intravedono le prime foglioline emergenti, continuare con i normali trattamenti antiperonosporici.

**Dose: g. 200**

Peronospora (*Plasmopara viticola*), Botrite (*Botrytis cinerea*) e Marciumi secondari (*Aspergillus spp.*, *Penicillium spp.*) iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare attenendosi alle disposizioni dei calendari di lotta della zona.

Mal bianco (*Uncinula necator*) - azione collaterale di contenimento che esprime compiutamente le sue potenzialità in miscela con antioidici specifici.

Iniziare ad intervenire in prefioritura

**Dose: g. 125-150**

Carie bianca (*Coniella diplodiella*): intervenire tempestivamente entro 12-18 ore dalla grandinata.

**Dose: g. 160-180**

**FRAGOLA:** contro Botrite (*Botrytis cinerea*), Vaiolatura (*Mycosphaerella fragariae*), Antracnosi (*Colletotrichum fragariae*), Maculatura.

**Dose: g. 200**

**POMODORO:** contro Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Botrite (*Botrytis cinerea*)

**Dose: g.150**

**MELONE:** contro Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Botrite (*Botrytis cinerea*)

**Dose: 1,2 kg/ha**

**PIOPPO:** contro Marssonina (*Marssonina brunnea*)

**Dose: g. 300-400**

**FLOREALI E ORNAMENTALI:** contro botrite e fitoftora (*Botrytis spp.* e *Phytophthora spp.*)

**Dose: g. 200-300**

Su FRAGOLA, POMODORO, MELONE, FLOREALI e ORNAMENTALI e PIOPPO trattare in funzione preventiva e di copertura a partire da quando si verificano le condizioni propizie per le infezioni.

Ripetere i trattamenti, se necessario, ad intervalli di 7-10 giorni.

Le dosi d'impiego si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale.

**Preparazione della sospensione:** stemperare il quantitativo stabilito di FOLPAN 80 WDG in poca acqua in modo da ottenere una pasta omogenea: diluire quindi questa poltiglia nella rimanente quantità di acqua, agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

**COMPATIBILITÀ:** FOLPAN 80 WDG è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali. Su FLOREALI e ORNAMENTALI eseguire applicazioni preliminari prima di effettuare il trattamento.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI SU UVE DA VINO 28 GIORNI PRIMA DELLA VENDEMMIA, 10 GIORNI PER FRAGOLA, 7 GIORNI PER POMODORO E 21 GIORNI PER MELONE**

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE CULTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**NON OPERARE CONTRO VENTO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE**

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** Irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritante gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); Interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilogeno nelle urine).

**Terapia:** sintomatica.

**AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**

“Etichette autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7/05/2008”