

FONGICIDE

OVERALL® 240 SC

Une suppression efficace de la pourriture sclérotique et de l'alternariose dans les cultures de luzerne et de canola.

MATIÈRE ACTIVE

Iprodione

GROUPE DE CHIMIE

Groupe 2

DOSES D'APPLICATION ET FORMATS

- 0,85 L/acre, soit 10 acres par bidon de 8,4 L
- 1,25 L/acre, soit 6,72 acres par bidon de 8,4 L
- 2 bidons de 8,4 L par caisse

CULTURE HOMOLOGUÉE :

- Canola

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Alternariose
- Pourriture sclérotique

FONCTIONNEMENT :

Fongicide systémique agissant par contact utilisé comme fongicide à action préventive et à action curative.

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DE LA CULTURE :

Culture	Maladies	Moment d'application
Canola	Pourriture sclérotique, alternariose (suppression)	Appliquer de 0,85 à 1,25 L/acre lorsque la culture a atteint le stade de floraison de 20 à 50 %. La meilleure protection est obtenue au stade de floraison de 20 à 30 %. Il s'agit de la période avant la chute des pétales; cette application permettra de protéger le plus grand nombre de pétales possible. Le fongicide Overall® 240 SC peut être appliqué jusqu'au stade de floraison de 50 %. Il s'agit de la période au cours de laquelle le canola affiche le jaune le plus vif et avant la perte d'un nombre important de pétales.
Canola	Alternariose (suppression)	Appliquer au stade de début de la cosse verte à une dose de 1,25 L/acre, ou faire deux applications fractionnées à une dose de 0,43 L/acre d'abord au stade de floraison de 20 à 50 %, puis au stade de début de la cosse verte. Si un traitement de 0,85 à 1,25 L/acre a été effectué au stade de floraison de 20 à 50 %, la pourriture sclérotique sera également supprimée.

OVERALL® 240 SC

VOLUME D'EAU :

- Par voie terrestre : minimum de 40 L/acre
- Par voie aérienne : minimum de 18 L/acre

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

- Retarder l'application si on prévoit des précipitations imminentes.
- Ne pas appliquer immédiatement après une précipitation.

MÉLANGES EN CUVE VALIDÉS :

Aucun mélange enregistré.

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Verser la moitié de la quantité d'eau requise dans la cuve du pulvérisateur.
2. Ajouter le fongicide Overall® 240 SC en remuant et ajouter le reste de l'eau.
3. S'assurer de bien mélanger.
4. Bien agiter avant chaque application et maintenir l'agitation durant toute la pulvérisation.
5. La bouillie de pulvérisation doit être utilisée dès que possible le jour même de sa préparation, surtout si l'eau utilisée pour le mélange est alcaline (pH supérieur à 7). On peut utiliser un affaiblisseur de pH tel que LI 700® à un taux de 0,125 % v/v.

ROTATION DES CULTURES :

Aucune

DÉLAI D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE

38 jours

ENTREPOSAGE :

Protéger du gel.

CONSEILS PRATIQUES :

Utiliser les outils de prévision pour déterminer la nécessité de faire des traitements fongicides.

