

FONGICIDE

TOPNOTCH™

Formulation unique à base d'azoxystrobine et de propiconazole qui assure une protection à large spectre contre les maladies foliaires des céréales.



MATIÈRES ACTIVES

Azoxystrobine et propiconazole

GROUPES DE CHIMIE

Groupe 3 (propiconazole) et groupe 11 (azoxystrobine)

DOSES D'APPLICATION ET FORMATS

- 212 mL/acre, soit 80 acres par caisse
- 2 bidons de 8,6 L par caisse

CULTURES HOMOLOGUÉES ET VALIDÉES

- Avoine
- Blé
- Orge
- Seigle
- Triticale

PRINCIPALES MALADIES SUPPRIMÉES :

- Rouille brune
- Rouille des feuilles de l'orge
- Rouille jaune
- Tache helminthosporienne
- Tache pâle
- Tache septorienne
- Taches réticulée et helminthosporienne

FONCTIONNEMENT :

Utilisé à la fois pour ses propriétés préventives et curatives, le fongicide Topnotch™ procure une activité de contact et systémique à large spectre.

MOMENT D'APPLICATION ET STADE DE LA CULTURE :

Culture	Maladies	Moment d'application	Dose
Avoine	Rayure réticulée de l'orge, rouille couronnée, tache septorienne	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (étapes de croissance 29 à 55).	0,53 L/ha
Blé	Tache septorienne, tache helminthosporienne, rouille jaune, rouille brune	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (étapes de croissance 29 à 55).	0,53 L/ha
Orge	Rayure réticulée de l'orge, tache pâle de l'orge, tache septorienne, rouille jaune, rouille des feuilles de l'orge, tache helminthosporienne	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (étapes de croissance 29 à 55).	0,53 L/ha
Seigle	Tache septorienne, tache pâle de l'orge, tache helminthosporienne	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (étapes de croissance 29 à 55).	0,53 L/ha
Triticale	Tache septorienne, tache helminthosporienne	Appliquer une fois entre la montaison et la mi-épiaison (étapes de croissance 29 à 55).	0,53 L/ha

TOPNOTCH™

VOLUME D'EAU :

- Par voie terrestre : minimum de 40 L/acre
- Par voie aérienne : 18 L/acre

RÉSISTANCE À L'ENTRAÎNEMENT PAR LA PLUIE :

Non spécifié.

MÉLANGES EN CUVE VALIDÉS :

Herbicides :

- Touchdown Total®
- Traxion™

Insecticides :

- Lambda-cyhalothrin (Silencer® 120 EC, Matador®)

Fongicides :

- Quadris®

DIRECTIVES DE MÉLANGE :

1. Remplir la cuve du pulvérisateur de la moitié ou les deux tiers avec de l'eau.
2. Le dispositif d'agitation en marche, ajouter la quantité requise de Topnotch™ et continuer l'agitation en ajoutant le reste de l'eau.
3. Commencer l'application quand Topnotch est complètement dissous dans l'eau de mélange et maintenir l'agitation durant toute l'application.

ROTATION DES CULTURES :

Ne pas ensemercer une autre culture destinée à l'alimentation, au pâturage ou à tout autre ingrédient faisant partie de l'alimentation ou de la litière animale pendant les 105 jours suivant l'application.

DÉLAI D'ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE :

45 jours

RESTRICTIONS CONCERNANT LE PÂTURAGE :

Aucune

ENTREPOSAGE :

Ne pas entreposer à des températures inférieures à 0 °C.

CONSEILS PRATIQUES :

Pour des résultats optimaux, il est important que la bouillie de pulvérisation couvre et pénètre bien le couvert végétal.

