

Apollo 50 SC

Akaricíd vo forme tekutého suspenzného koncentrátu, určený na ničenie vajíčok a prvých pohyblivých štádií roztočcov v ovocných drevinách a v okrasných rastlinách.



Roztočce pod kontrolou

Výhody použitia

- ▶ spoľahlivá účinnosť
- ▶ krátka ochranná doba
- ▶ široký termín použitia
- ▶ vynikajúci ovolarvicídny účinok

Pôsobenie prípravku

Apollo 50 SC je špecifický kontaktný akaricíd, ničiaci vajíčka a prvé pohyblivé štádia roztočcov. Dospelé jedince neníči, preto pri aplikácii na rozvinutú populáciu roztočcov, zahrňujúcu aj dospelé jedince, sa účinok prejaví až s odstupom dvoch týždňov.

Apollo 50 SC má výborný reziduálny účinok. Pre včely je relatívne neškodný a je bezpečný aj pre iné druhy užitočných živočíchov, najmä Amblyseilus, Phytomyza, Anthrenus, Chrysopa, Orius, Stethorus a Encarsia.

Termín aplikácie

Pri ošetrovaní jadier a kôstkovín pred kvetom ošetrte na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Pri odporúčaných dávkach nebola doposiaľ na hlavných plodinách a odrodách pozorovaná fytotoxicita. Na zlepšenie a predĺženie akaricídneho účinku do postrekov pridajte 0,1 - 0,2 l/ha Rollwet, čo predlžuje ochranné krytie a eliminuje vplyvy počasia.

Prípravok Apollo 50 SC je miešateľný s väčšinou bežne používaných insekticídov, fungicídov a emulgovateľných olejov.

Upozornenie

Opakované používanie akaricídov s rovnakým mechanizmom účinku môže viesť k rozvoju rezistentnej populácie roztočcov. Na zabránenie, alebo oddialenie vývoja rezistencie odporúčame používať prípravok Apollo 50 SC nasledujúcim spôsobom:

**VÁŠ PRVÝ KROK
V OCHRANE SADOV
A OKRASNÝCH RASTLÍN
VOČI ROZTOČCOM.**

**VAŠA KULTÚRA NIE
JE SPRÁVNYM MIESTOM
NA ZALOŽENIE ICH POPULÁCIE.**

Účinná látka:

500 g/l clofentezin

Formulácia:

Suspenzný koncentrát

Balenie:

1 l

Dávka vody:

800 - 1000 l/ha

Apollo 50 SC je akaricíd/ovicíd narúšajúci rozvoj populácií roztočcov inhibíciou vývoja vajíčok a prvých pohyblivých štádií.

Odporúčenie pre aplikáciu

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka / ha	OD	Poznámka
jabloň, hruška	roztočce	0,4l	40	
čerešňa, višňa	roztočce	0,4l	45	
okrasné rastliny, okrasné dreviny	roztočce	0,04%	5	

Ovocné dreviny

Počas jednej vegetačnej sezóny aplikujte na tom istom pozemku prípravok Apollo 50 SC najviac jedenkrát za sezónu.

Okrasné rastliny

Prípravok Apollo 50 SC používajte maximálne dvakrát počas jednej vegetačnej sezóny, nie však tesne za sebou. Ošetrovanie je nutné striedať s inými prípravkami.

Mimoetiketové použitie

V jahodách aplikujte proti roztočkovému v jahodovému v dávke 0,4 l/ha.



optimálny čas pre aplikáciu Apollo 50 SC



Pre zlepšenie účinku prípravku odporúčame pridať pomocnú látku **Rollwet**.