

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 08.04.2014 ve 9613
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE
YABANCI OTLAR:

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANIM DOZU	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Soğan	Çatal Otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Meryem Dikeni (<i>Silybum marianum</i>) Kuş Otu (<i>Stellaria media</i>) Tırfıl (<i>Oxalis spp</i>) Ebegümeçi (<i>Malva neglecta</i>) Hakiki Papatya (<i>Matricaria chamomilla</i>) Kıvrıcık Labada (<i>Rumex crispus</i>) Kırmızı Çiçekli Balhbaba (<i>Lamium purpureum</i>) Yabani Turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yavşan Otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Çoban Çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	330 ml/da Çıkış öncesi	21 gün
Ayçiçeği	Kırmızı Köklü Tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Duvar Kaz ayağı (<i>Chenopodium murale</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Yabani kavun (<i>Cucumis melo var. agrestis</i>) Fiçi otu (<i>Euphorbia apios</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>)	330 ml/da Çıkış öncesi	-
Pamuk	Kırmızı Köklü Tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Sürünücü horoz ibiği (<i>Amaranthus blitoides</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Fener otu (<i>Physalis angulata</i>) Ebegümeçi (<i>Malva sylvestris</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	330 ml/da Çıkış öncesi	-

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CİNDER® 400 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	K1,3	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	------	----------------------------

400 g/l PENDİMETHALİN

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Yutma: Ağzı su ile yıkayın. Bol su için. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Ciltle Temas: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözlerle Temas: Önlem ifadelerine bakınız, hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Dr. Nesrin KAYKAR ARICAN
Daire Başkanı V.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
19 Şubat 2021

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı (Kdv dahil):

İÇİNDEKİLER

Pendimethalin



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği / kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, ince ve keseksiz olmalıdır.
- Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
- İlaçtan en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
- Su göllen yerlerde kullanılmamalıdır.
- CİNDER 400 CS, hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.
- İlaçlama düzgün yapılmamışsa, yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye zarar verir.
- Bahçklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajların usulüne uygun imha ediniz.
- Uygulamadan sonra ilaçlama aleti deposunu iyice yıkayıp temizleyiniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Ali TETİK
Ruhsatlandırma Müdürü



ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3 Sunucu Plaza B Blok K:8 D:806/807
808/809/810 Konak - İZMİR
Tel. : 0 232 462 61 40
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993

Mısır	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colorum</i>)	330 ml/da Çıkış öncesi	-
Fasulye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yeşil horoz ibiği (<i>Amaranthus viridis</i>) Yapışkan ot (<i>Setaria verticillata</i>)	330 ml/da Çıkış öncesi	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulamanın başarısı için iyi bir toprak hazırlığı önemlidir. CİNDER 400 CS iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa soğan, pamuk, ayçiçeği, mısır ve fasulye ekiminden sonra, çıkış öncesi uygulanır. CİNDER 400 CS yeterli su miktarı ve yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle uygulanmalıdır. Kurak hava şartlarında, CİNDER 400 CS uygulamasının ardından 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CİNDER® 400 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	K1,3	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	------	----------------------------

400 g/l PENDİMETHALİN

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisini altındadır.

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ:

Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

ADAMA TURKEY Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3/0806 Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40



Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı V.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Şubat 2021

(Handwritten signature)

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Cinder 400 CS uygulandıktan sonra ekilebilecek bitkiler
Hemen; pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve
şaşırtılan bitkiler,
6 ay sonra; diğer bitkiler,
Herhangi bir nedenle Cinder 400 CS uygulanan tarla bozulduğunda;
Toprak 15 cm işlenerek; buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya
ve bezelye,
Toprak işlenmeden; mısır, fasulye ve bezelye.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CİNDER 400 CS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip
bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için CİNDER 400
CS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen
gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir
karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CİNDER® 400 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUP	K1,3	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
------	------	----------------------------

400 g/l PENDİMETHALİN

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

19 Şubat 2021



Ali TETİK
Ruhsatlandırma Müdürü



ADAMA TURKEY
TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3 Sunucu Plaza B Blok K:8 D:806/807
808/809/810 Konak - İZMİR
Tel. : 0 232 462 61 40
Karşıyaka V.D. : 007 0622 993