



INSECTICIDA



ADAMA

Zariva

Volteo y residualidad reconocidos



Zariva combina la acción de dos insecticidas, una bisamida y un piretroide, con diferente modo de acción. Presenta actividad ovicida y adulticida, otorgando un un amplio espectro de control, especialmente sobre larvas de Lepidópteros.

- Excelente poder de volteo
- Amplia persistencia de control
- Actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.
- Contiene sus principios activos en partículas sólidas y microcápsulas
- Otorga mejor mezclado en el tanque permitiendo realizar aplicaciones más eficaces.

**Ingrediente Activo**

Clorantraniliprole 10%  
Lambdacialotrina 5%



|      |   |                           |   |
|------|---|---------------------------|---|
| SOJA | Oruga de las leguminosas<br>( <i>Anticarsia gemmatalis</i> )<br>Oruga medidora<br>( <i>Rachiplusia nu</i> ) | 30-40 cm <sup>3</sup> /ha | Aplicar cuando se encuentren 10 larvas pequeñas por metro lineal. Recurrir a la dosis mayor con alta presión de orugas y cuando existe riesgo de reinfestación. |
|      | Isoca Bolillera<br>( <i>Heliothis spp.</i> )  | 50 cm <sup>3</sup> /ha    | Aplicar al detectar daño inicial en hojas o vainas en 5% de las plantas y/o 1 oruga/metro de surco.   |
|      | Spodoptera<br>( <i>Spodoptera sp.</i> )   | 50 cm <sup>3</sup> /ha    | Aplicar cuando se encuentren 10 larvas mayores a L3 por metro lineal.   |
|      | Oruga falsa medidora<br>( <i>Chrysodeixis includens</i> )   | 100 cm <sup>3</sup> /ha   | Aplicar al inicio de ataque al detectar 5 larvas/metro lineal.  |