HERBICIDA

ADAMA

Mayoral

Una caña con Mayoral no tiene competencia

La mejor relación de costo de control por día de aplicación.

Herbicida residual preemergente para Caña planta y Caña Soca. Permite obtener un excelente control en malezas de difícil manejo, asegurando un período prolongado de más de 100 días sin competencia.

Escuchamos ▸ Aprendemos ▸ Solucionamos

ADAMA.COM

HERBICIDA

Mayoral®

Más de 100 días de soledad.

En su cultivo de caña. Sólo caña.

La presencia de malezas puede afectar gravemente el rendimiento de su cultivo de caña de azúcar, sobre todo en la fase de emergencia. Ellas representan una fuerte competencia por los recursos vitales (humedad, luz, nutrientes) pudiendo generar una merma en el rendimiento de hasta un 40%.

Mayoral® controla eficazmente las malezas por más de 100 días, permitiendo mayor crecimiento **y producción.**

Un producto. Muchos beneficios.

- EXCELENTE PERFORMANCE DE CONTROL
- MÁXIMA RESIDUALIDAD, MAYOR A 100 DÍAS
- MENOR COSTO DE CONTROL POR DÍA
- REDUCCIÓN DE LABORES
- AUSENCIA DE COMPETENCIA INICIAL CULTIVO VS. MALEZAS

Modo de acción

Máxima efectividad

El proceso de absorción se da por hojas y raíces, siendo rápidamente translocado vía Floema y Xilema, acumulándose en los tejidos meristemáticos de las malezas.

El cese del crecimiento ocurre poco después del tratamiento, pero la acción de Mayoral® será evidente pocas semanas después de la aplicación. En las malezas emergidas se observa una disminución del crecimiento, achaparramiento y acortamiento de entrenudos.

La excelente residualidad en suelo permite el control preemergente de malezas durante más de 3 meses después de la aplicación.

Excelente control de malezas

Mayoral® 500 cc/ha

Cebollín - Testigo | Cebollín - Con Mayoral®

Pasto Cubano - Testigo | Pasto Cubano - Con Mayoral®

Sorgo de Alepo - Testigo | Sorgo de Alepo - Con Mayoral®

Momento de aplicación

Diurex Diuron 80% FW

Terbutrex Terbutrina 50% FW

Ametrex Ametrina 80% WG

Mesoflex Mesotrione 48% SC

Tomahawk Fluroxipir 20% EC

Mayoral
Imazapic 26,2%
+ Imazapyr 8,7% SL

Residualidad mayor a 100 días



Chloris spp, Cebollin (cyperus spp.), Sorgo de Alepo, Amaranthus spp, Digitaria spp, Gramón (Synodon Dactylon), Echinochloa, Pasto Cubano (Tithonia tubiformis),

Cebollín (Cyperus esculentus), Pasto Cubano (Tithonia tubiformis), Tupulo (Sicyos polyacanthus), Verdolaga (Portulaca oleracea), Digitaria spp., Eleusine indica, Quínoa (Chenopodium album), Saetilla (Bidens pilosa), Ataco (Amaranthus quitensis)

Recomendaciones de uso

Maleza	Dosis	Momento de aplicación
Cebollín (Cyperus rotundus) Chufa (Cyperus esculentus) Capín (Echinocloa spp.) Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense) Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (Cynodon dactylon) Pasto cuaresma (Digitaria spp.) Yuyo colorado (Amaranthus spp) Lecherón (Euphorbia spp) Verdolaga (Portulaca olareacea) Pasto Cubano (Tithonia tubiformis)	Suelos Livianos: 400 cc/ha. Suelos medios y pesados: 500 cc/ha.	Aplicar en preemergencia del cultivo en Caña Planta o Caña Soca. Se puede aplicar en pre emergencia o post emergencia temprana de malezas. Para alcanzar la máxima actividad del producto aplicar en malezas no emergidas o que no superen las 4 hojas verdaderas y estén en un período de activo crecimiento.

Lea las recomendaciones del marbete antes de usar.

Principios activos:

Imazapic + Imazapyr 350 SL

Mayoral® no se retiene en el rastrojo, por lo que no es un limitante para la acción del producto. Ha sido testeado en la Argentina en las siguientes variedades de caña de azúcar: CP 65-357, Tuc 77-42, LCP 85-384 y NA 97-3152. Para su recomendación en variedades nuevas se deberán realizar pruebas de fito compatibilidad.

Nueva tecnología para aplicación de Mayoral en postemergencia

Adama desarrolló una alianza estratégica con la empresa TyT para simplificar las tareas de control de malezas en caña de azúcar, ampliando el uso de Mayoral en el cañaveral al extender la posibilidad de uso del producto en post emergencia del cultivo.

Con la tecnología de aplicación dirigida TyT, es posible iniciar las aplicaciones tempranas para el control de malezas en forma eficiente y anticipada una vez nacida la caña con sus primeras hojas abiertas. Las aplicaciones de Mayoral se realizan en el entre surco, solo o con glifosato u otros acompañantes (Atranex, Mesoflex y otros). Adicionalmente, gracias al doble circuito del sistema TyT, también se puede complementar con aplicaciones sobre la línea del cultivo con productos selectivos.

Se trata de una tecnología versátil en su momento de uso, ya que puede utilizarse mientras la altura del cañaveral permita la entrada al mismo, antes del cierre.

La combinación de herramientas mecánicas y químicas como la tecnología TyT-Mayoral hacen más eficiente el control de malezas en el cañaveral.

ADAMA

Estamos en las redes @AdamaArgentina

Con el uso de Mayoral accedés a Adama Sat. Consultá en tu distribuidor Adama Black

ADAMA ARGENTINA S.A. Cerrito 1186 8° Piso | (C1010AAX) | Buenos Aires | Argentina | Teléfono: +54-11-48136040 | Fax. +54-11-48136082

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA