



ADAMA

Portfolio

Cereales de invierno

PORTFOLIO

PRE-SIEMBRA

PRE-EMERGENCIA

PRE-EMERGENCIA
Y POST-EMERGENCIA
TEMPRANA

POST-EMERGENCIA



FUNGICIDAS

Protección total, desde el barbecho hasta la espiga.



Premerge + Oxalis

MALEZAS TARGET:
RAIGRÁS Y AVENA EN PRE-EMERGENCIA

- Alta residualidad, dependiendo de las condiciones climáticas.
- Control de crucíferas resistentes a EPSPs, ALS y Hormonales.
- Mezcla dos modos de acción (antiresistencia).
- No necesita ser incorporado por labor mecánica.




60 DDA - Testigo vs Premerge + Oxalis



MOMENTO DE APLICACIÓN:
Hasta 20 DAS*
1,5 l/ha + 0,12 l/ha

*La carencia es por Oxalis, 20 DAS en cebada y hasta 10 DAS en trigo. Premerge puede aplicarse hasta pre-emergencia del cultivo.



Premerge Trifluralina 60% EC Oxalis Flumioxazin 48% SC

- Herbicida selectivo y preemergente
- Fotoestable
- Actúa durante la germinación inhibiendo el crecimiento radicular.
- Lluvias posteriores a la aplicación ayudan en su incorporación mejorando su desempeño.
- No tiene acción sobre malezas ya emergidas.
- MOA: Interrumpe la división celular (microtúbulos)

- MOA: PPO
- Herbicida de contacto, control en preemergencia y postemergencia temprana
- Alta residualidad
- Amplio control de latifoliadas
- Supresión de gramíneas
- Baja solubilidad
- No es propenso a la lixiviación o volatilización.

Terbutrex

Terbutrina 50% SC

La seguridad de ver a tu trigo limpio de crucíferas

- Gran compatibilidad con diferentes modos de acción (PPO; Inhibidores de carotenos, Inhibidores PSI, Hormonales y Sulfonilureas).
- Herramienta ideal para disminuir la carga de Flurocloridona en el suelo.
- Ventana de protección de al menos 30 días en trigo.
- Ideal para estrategias de control de crucíferas resistentes.
- Modo de acción diferente (Triazina) para el manejo de resistencias a ALS, EPSPs y hormonales (2,4D).
- Excelente selectividad en trigo y cebada.



CONTROL DE MALEZAS DIFÍCILES



Brassica rapa (nabo)

Raphanus sativus (Nabón)

Conyza spp (Rama negra)

ESCENARIO CRUCÍFERAS



En lotes con alta presión de crucíferas con coberturas mayor al 30% y malezas crucíferas en estadios más avanzados (rosetas en elongación) se recomienda el uso de Secafol (2l/ha). Recomendamos el uso de Terbutrex con MSO.

ESCENARIO RAIGRÁS + CRUCÍFERAS



Recomendamos el uso de Terbutrex con MSO.

Terbutrex

Terbutrina 50% SC

ENSAYOS DTM ADAMA


TESTIGO (30 DDA)



TERBUTREX + RAINBOW (30 DDA)



CRUCÍFERAS (Datos Ensayos Bitfield - Balcarce)



Control (%) de crucíferas según tratamiento a los 50, 59, 71, 85 y 102 días desde la aplicación de los herbicidas pre-siembra (DDA)

Terbutrex

Terbutrina 50% SC

ENSAYO RAMÓN GIGÓN


TESTIGO LOLIUM + CRUCIFERAS



TERBUTREX



% CONTROL BRASSICA RAPA (Promedio Tres Arroyos / B. Juárez)



% CONTROL LOLIUM SP



PRE SIEMBRA: Premerge(1.5) + Oxalis (0.12)
 PRE EMERGENCIA: Terbutrex (1.2) + Rainbow (0.7)
 POST EMERGENCIA: Rainbow (0.5)

Ensayo realizado por Ramón Gigón en Trigo y Cebada campaña 21/22

Rainbow Flurocloridona 25% EC


Rápido control de malezas de hoja ancha

MALEZAS TARGET: CRUCIFERAS EN PRE EMERGENCIA O ESTADIO COTILEDONAR

- Controla malezas durante la germinación y también durante los primeros estadios de crecimiento.
- No es arrastrado por lluvias excesivas y se activa con escasa humedad en el suelo.
- MOA: PDS (Bloquea la síntesis de carotenos y destruye la clorofila por fotooxidación). Puede producir una leve clorosis en las primeras hojas de los cultivos, sin afectar el desarrollo posterior de los mismos.
- Buena residualidad.
- Compatible con hormonales y Bromotril.



MOMENTO DE APLICACIÓN:
Hasta Pre Emergencia
1-1,5 l/ha
Desde 3 hojas a macollaje 0,5 l/ha



COMENZANDO A BLANQUEAR



APLICACIÓN EN BARBECHO




APLICACIÓN EN POST EM TEMPRANA

Pinxit

Pinoxaden 5% EC

- Herbicida postemergente de acción sistémica, pertenece al grupo químico fenilpirazol.
- Inhibición de la Acetil CoA Carboxilasa (ACCase).
- Se absorbe a través de las hojas y es trasladado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, inhibiendo el desarrollo de las malezas.



MOMENTO DE APLICACIÓN:
Desde 3 hojas a encañazón
Dosis: 0,6 a 0,8 l/ha

Legacy Diflufenican 50% SC

- Herbicida derivado de las anilidas, controla eficazmente malezas de hoja ancha.
- Por su alto poder residual es excelente para uso en barbechos químicos y en siembra directa.
- Es absorbido principalmente por hipocótilo. Las malezas afectadas muestran una marcada decoloración y mueren alrededor de los 5 días.
- Su acción está ligada con la intensidad de la luz.
- La ocurrencia de heladas puede afectar su acción.



MOMENTO DE APLICACIÓN:
Desde 3 hojas a macollaje
Dosis: 0,2 l/ha



Tribune Metribuzin 70% WG

- Herbicida residual del grupo de las triazinonas, utilizado en post emergencia temprana para control de un amplio rango de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales.
- Es absorbido predominantemente por raíces y en menor medida por las hojas. Posee translocación acropeta en el xilema.
- Vida media de 30 días.



DOSIS
0,3 kg/ha

Bromotril Bromoxinil 24% EC

- Herbicida post-emergente de alta selectividad.
- Controla malezas de hoja ancha, resistentes a los herbicidas fenoxiacéticos (2,4-D, 2,4-DB y MCPA).
- Actúa por contacto inhibiendo la fotosíntesis y respiración, provocando la muerte de las malezas a los 6-7 días de su aplicación.



DOSIS
0,8 a 1 l/ha



POSICIONAMIENTO POST EMERGENCIA



Trigo Baguette 802 F. Siembra 15/06/19, F. Aplicación 17/09/19
Ochandío - RAMON GIGON
Al momento de la aplicación la maleza presentaba 5cm de diámetro

Trigo Baguette 802 F. Aplicación 12/08/19 en Z22
Ochandío - RAMON GIGON
Al momento de la aplicación la maleza presentaba más de 8cm de diámetro

Clopix Clopiralid 36% SL

- Herbicida selectivo sistémico de acción hormonal.
- Aplicar sobre malezas pequeñas, en estado de crecimiento activo.
- Es absorbido por las malezas por vía foliar y radicular y se transloca hacia los meristemas que es donde ejerce su acción.
- No aplicar en condiciones de sequia persistente.



DOSIS
0,25 l/ha

Aplicar desde 1-2 macollos hasta antes de la aparición del primer nudo de encañado. No aplicar a partir de encañado

Tomahawk Supra Fluroxipir 48% EC

- Herbicida selectivo sistémico de acción hormonal.
- Amplio espectro de control de latifoliadas.
- Único herbicida hormonal que puede emplearse en trigo y cebada hasta hoja bandera.



DOSIS
0,27 a 0,36 l/ha

Aplicar desde 3 hojas hasta hoja bandera visible.





Máxima sanidad para tus cereales

Custodia T

Sistemia superior a tu alcance

Tetraconazol 8% + Azoxystrobina 10% SC



DOSIS
0,6 a 0,8 l/ha
+ 0,5 l/ha coadyuvante

- Amplio espectro de acción.
- Hidrosolubilidad Balanceada con Liposolubilidad.
- Translocado a través de la planta y distribución homogénea a todas las partes de la planta.
- Excelente sistemia que otorga una actividad endoterápica duradera.
- Actividad notable como protector, curativo y erradicante.
- Excelente seguridad en los cultivos (sin daños en el cultivo ni enanismo).
- Versatilidad / compatibilidad con otros productos.
- Excelente relación costo beneficio.
- Con tetraconazole que logra un control superior vs otros triazoles.



Coverfull Ace

La carboxamida más competitiva

Propiconazol 25% + Benzovindiflupyr 4% Solatenol TM EC



DOSIS
0,5 l/ha

- Es la combinación de dos activos que poseen diferentes sitios de acción.
- Apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes.
- Solatenol TM inhibe el crecimiento del hongo a muy bajas concentraciones de activo demostrando alta actividad intrínseca en el control de royas.
- Muy buena persistencia.
- Excelente eficacia en el control de manchas y roya.




Posicionamiento en trigo y cebada



Posicionamiento en trigo

Driver aplicación:


Z32 target royas y manchas
Z39 target royas y manchas



Posicionamiento en cebada

Driver aplicación:

Z32 manchas y royas
Z37 ramularia y royas



ENSAYOS INTA BALCARCE

TESTIGO



CUSTODIA T + ACADIA BIO





Estamos en las redes      @AdamaArgentina

ADAMA ARGENTINA S.A. Tronador 4890 8° Piso | (C1430DNN) | CABA | Argentina | Teléfono: +54 11 3986 4572 | adama.com/argentina

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA