

Diana Póltl
Diseñadora Grafica UBA
(54911) 2253 2110
diana_poltl@hotmail

trabajo: librito F Rimon Fast x 5 L
tamaño: ancho: 160 mm x 150 mm alto
fecha: 26/11/2014


K 408CP 254CP Pant. 199C PMS Yellow

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	MOMENTOS DE APLICACION
SOJA	Oruga militar tardía <i>(Spodoptera frugiperda)</i> Oruga de la leguminosas <i>(Anticarsia gemmatalis)</i> Oruga falsa medidora <i>(Pseudoplusia includens)</i> Oruga medidora <i>(Rachiplusia un)</i>	200 cc/ha + 500 cc/ha de Aceite mineral	Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado 10 orugas menores a L3 por m ² de cultivo.
	Trips		Aplicar con un promedio de 5 ninfas por foliolo.
	Tucuras		Aplicar con promedio 2 tucuras chicas por m ² .

Es recomendable implementar un cuidadoso monitoreo de la plaga y o seguir los métodos de monitoreo recomendados en cada región para decidir el momento correcto de la aplicación y obtener la mejor eficacia del producto. Si fuese necesario realizar una nueva aplicación de **RIMON FAST**, observar el nivel de infestación procediendo de acuerdo a las instrucciones de uso siguiendo siempre las buenas prácticas agrícolas.

RESTRICCIONES DE USO:

El intervalo entre la última aplicación y la cosecha deberá ser de 30 días.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, debe conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

COMPATIBILIDAD:

RIMON FAST Puede aplicarse sin inconveniente alguno en mezcla de tanque con insecticidas y funguicidas neutros. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

FITOTOXICIDAD

RIMON FAST ha demostrado una alta selectividad para los cultivos recomendados. En las condiciones recomendadas, el producto no resulta fitotóxico.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Aviso de responsabilidad legal:

Este producto se elabora según normas de estricta calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haber observado las precauciones recomendadas o de no conservarlo en condiciones normales de almacenamiento.

INSECTICIDA

Grupo 15: inhibidor de biosíntesis de quitina.
Grupo 3: Modulador del canal de sodio.

ADAMA
Rimon Fast®

COMPOSICIÓN:


novaluron:
(1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl]
-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea 5 g
bifentrin:
2-metilbifenil-3-ilmetil (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)
-2,2-dimetilciclopropano carboxilato..... 5 g
inertes y coadyuvantes..... c.s.p..... 100 cm3

Suspensión Concentrada

LEA INTEGRAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR
EL PRODUCTO

Inscripto en el Senasa con el N° 36.388

Vencimiento: Ver Envase
Lote N°: Ver envase
Origen: Israel
No Inflamable
Contenido Neto: **5 Litros**



INSECTICIDA

ADAMA Argentina S.A. una empresa del Grupo Adama Agricultural Solutions LTD - Cerrito 1186, 8° Piso, C1010 C.A.B.A. - Argentina - Tel: (011) 4813-6040 Fax: (011) 4813-6082 - mail: info@adama.com / www.adama.com

97030953D/201411



NOCIVO



