



ГОЛТИКС® ГОЛД

Инновационная формуляция
препарата ГОЛТИКС®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действующее вещество: метамитрон 700 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии

Химический класс: триазины

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ фундамент защиты посевов сахарной свеклы
- ▶ усовершенствованная препаративная форма суспензионного концентрата способствует оптимальному распределению и поглощению действующего вещества в сравнении с оригинальным препаратом ГОЛТИКС®
- ▶ пролонгированное защитное действие благодаря устойчивости к ультрафиолету

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Крестовник обыкновенный, лебеда, марь (виды), пастушья сумка, пикульник (виды), ромашка (виды), фиалка полевая, другие виды однолетних сорных растений.

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Кратность обработок
5–6	Свекла сахарная и кормовая (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1–2 настоящих листьев культуры	1
1,5			Трехкратное опрыскивание: первое — в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье — по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама	3

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

ГОЛТИКС® ГОЛД оказывает хорошее начальное действие, длительно сохраняющее эффективность.

Период защитного действия: 40–60 дней в зависимости от видового состава и фазы развития сорняков, а также погодных условий после обработки препаратом.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ГОЛТИКС® ГОЛД проникает в растения как через листья (листовое действие), так и через корни (почвенное действие), благодаря чему его применение позволяет задержать появление второй волны сорняков. Препарат влияет на корневое всасывание и блокирует фотосинтез в листьях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГОЛТИКС® ГОЛД может быть использован перед посевом, а также до и после всходов культуры. Для расширения спектра действия против трудноискореняемых сорняков рекомендуется использовать **ГОЛТИКС® ГОЛД** в баковой смеси с препаратами ADAMA, зарегистрированными на сахарной свекле.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

ГОЛТИКС® ГОЛД можно смешивать с гербицидами бетанальной группы. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует предварительно проверять на совместимость и обращаться к инструкции по применению.



СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить препарат в невскрытой заводской упаковке на складе для пестицидов, в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от -5 до $+35$ °С. Однако хранить препарат при температуре ниже 0 °С не рекомендуется.

Гарантийный срок хранения: в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Информация
о продукте

