



КУСТОДИЯ™

Фунгицид
системно-трансламинарного действия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действующие вещества: азоксистробин 120 г/л + тебуконазол 200 г/л

Препаративная форма: концентрат суспензии

Химический класс: стробилурины и триазолы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ высокоэффективен в отношении комплекса болезней основных сельскохозяйственных культур
- ▶ длительный период защиты

РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок	
0,75-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1	
	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз				
	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость				
1,0-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз				1-2
	Рапс яровой					
	Кукуруза	Пузырчатая головня			63	1
	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз			30	
	Подсолнечник масличный	Альтернариоз, белая и серая гниль			34	

СКОРОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПЕРИОД ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Действующие вещества поглощаются ассимилирующими частями растения в течение 1 часа и распространяются акропетально по ксилеме растения, с этого момента начинается воздействие препарата на возбудителя болезни.

Период защитного действия: 2-3 недели.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Фитотоксичность. При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению не создается риска возникновения фитотоксичности.

Возможность варьирования культур в севообороте. Не ограничена при соблюдении рекомендованных компанией правил применения препарата.

Возможность возникновения резистентности. Потенциальный риск развития резистентности к компонентам препарата **КУСТОДИЯ™** у возбудителей заболеваний рапса и зерновых культур маловероятен. Тем не менее для предотвращения возникновения устойчивых популяций следует четко соблюдать рекомендации по применению в рамках антирезистентной стратегии: не понижать рекомендованные нормы расхода препарата, чередовать использование фунгицида **КУСТОДИЯ™** с препаратами на основе действующих веществ других химических классов.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПЕСТИЦИДАМИ

КУСТОДИЯ™ не предназначена для применения в составе баковых смесей. В случае необходимости перед применением рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить препарат только в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от 0 до +35 °С, в местах, предназначенных для хранения пестицидов, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды. Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.

Информация
о продукте

