




ADAMA



КОРМОРАН®

ВАШ УРОЖАЙ — НЕ КОРМ
ДЛЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ



ИНСЕКТИЦИД

[ADAMA.COM/BELARUS](https://adama.com/belarus)



ADAMA



WWW.ADAMA.COM



КОРМОРАН®

Высокотехнологичный комбинированный
инсектицид с длительным защитным действием
против широкого спектра вредителей
на всех стадиях их развития,
безопасен для энтомофагов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- контролирует вредителей на всех стадиях развития
- обеспечивает длительное защитное действие
- работает в широком диапазоне температур
- предупреждает развитие резистентности
- безопасен для полезной энтомофауны и опылителей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Действующее вещество: новалурон 100 г/л + ацетамиприд 80 г/л

Препаративная форма: КЭ (концентрат эмульсии)

Способ действия: контактно-кишечный

Культура:

● яблоня

Упаковка: бутылка 1 л, канистра 5 л

Срок годности: 3 года

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

● тли (1)

● листогрызущие гусеницы (2)

● яблонная плодожорка (3)

● яблонная листовая галлица (4)

● яблонный плодовой
пилильщик (5)



Культура	Норма расхода, л/га	Контролируемый объект	Способ, сроки обработки, особенности применения	Срок ожидания, дней (кратность обработок)
Яблоня	0,3–0,6	Тли, яблонная листовая галлица, листогрызущие гусеницы, яблонный плодовый пилильщик, яблонная плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация — 0,05%. Расход рабочей жидкости 600–1200 л/га	20 (1–2)


Рассчитывайте **объем рабочего раствора**, исходя из высоты и суммарной площади листовой поверхности кроны дерева.

НОВАЛУРОН

Химический класс (IRAC):

ингибиторы биосинтеза хитина.


Механизм действия: нарушает процессы образования хитина (кутикулы) и препятствует процессу линьки (переходу личинок из одной стадии в другую). Предотвращает отрождение личинок из яиц, отложенных на обработанную поверхность и яиц, попавших под обработку, а также снижает плодовитость самок.



АЦЕТАМИПРИД

Химический класс (IRAC): неоникотиноиды.

Механизм действия: связывается с постсинаптическими никотин — ацетилхолиновыми рецепторами ЦНС насекомых, что приводит к параличу и конвульсиям, приводящим к гибели. Характеризуется системным действием, распространяется сосудистой системой растения по всем его частям. Вредители погибают как от непосредственного контакта, так и вследствие питания на обработанных препаратом растениях.



КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

Яйцо



Из яиц, попавших под обработку и отложенных на обработанную поверхность, не отрождаются гусеницы

Личинка



В личинках, попавших под обработку, нарушается выработка хитина, что приводит к невозможности перехода гусениц из одного возраста в другой

Имаго



Транс-овариальное воздействие: снижается плодовитость самок

ВЫСОКАЯ ОВИЦИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ОБРАБОТКИ



Уничтожает яйца,
отложенные как до,
так и после
обработки!

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА МАССОВОГО ЛЕТА ВРЕДИТЕЛЯ

Поколение вредителя	Количество самцов в ловушке
1-е поколение	Более 7 за 7 дней на 1 ловушку



ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАБОТОК

Начало массового лета
1-го поколения



7-10
дней



Проведение обработки



ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА


КОРМОРАН
0,3–0,6 л/га

Период вредоносности яблонной плодовой




РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ИНСЕКТИЦИДА КОРМОРАН® НА ЯБЛОНЕ


ЗАСЕЛЕНИЕ ПОБЕГОВ ЗЕЛЕННОЙ ЯБЛОННОЙ ТЛЁЙ ЧЕРЕЗ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ, %



КОЛИЧЕСТВО ПЛОДОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ В ПАДАЛИЦЕ, %



КОЛИЧЕСТВО ПЛОДОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ В УРОЖАЕ, %



ОКНО ПРИМЕНЕНИЯ



МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Яблоня	Букарка, казарка, тля, яблоневый цветоед, яблонная плодожорка, яблонная моль, листовертки, долгоносик серый почечный, плодовой пилильщик, совки, цикадки
Картофель	Колорадский жук, тля, совка, цикадки
Томат	Колорадский жук, тля, совка
Лук	Трипс, луковая муха
Косточковые	Вишневая плодовая муха, восточная плодовая моль
Перец	Колорадский жук, тля, кукурузный мотылек, совки
Салат	Тля
Капуста	Совки, капустная моль, тля
Кукуруза	Тля, совки

ВЛИЯНИЕ НА ОПЫЛИТЕЛЕЙ

-



КОРМОРАН®



ADAMA

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

Дмитрий Гунько

Моб.: +375 (29) 333 49 45

E-mail: dzmitry.hunko@adama.com

Дмитрий Пляцев

Моб.: +375 (29) 633 22 17

E-mail: dzmitry.pliatsau@adama.com

WWW.ADAMA.COM