

КУСТОДИЯ

CUSTODIA®

Фунгицид

концентрат суспензии

Просканируйте
для получения
подробной информации



**Перед применением
внимательно прочитать!**

Наименование и содержание действующих веществ: азоксистробин, 120 г/л + тебуконазол, 200 г/л.

Назначение: комбинированный фунгицид системно-трансламинарного действия для защиты посевов зерновых и масличных культур, свеклы от комплекса болезней.

Область применения: сельскохозяйственное производство.

Номер государственной регистрации:
ГР 02-0228.

**Регистрационный номер
тарной этикетки:** ТРБ-02-0254.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке.

Дата изготовления и номер партии: указаны на упаковке.

Условия хранения. Хранить препарат в не вскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений, в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 0 °С до +35 °С.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении. Соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и изложенные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».



ADAMA

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается только в не вскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты.

Регистрант / Заявитель:
ООО «АДАМА РУС»,
ОГРН 1062310039934,
Россия, 105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9, эт. 5, пом. I, ком. 8.
Тел./факс +7 (495) 123-32-72,
russia@adama.com,
www.adama.com/russia.

Изготовитель:
АДАМА Мактешим Лтд., п/я 60,
Безр-Шева, 8410001, Израиль.
Тел. +972 (8) 629-67-13,
факс +972 (8) 629-69-11, www.adama.com.

Номинальный объем: 5 л

КУСТОДИЯ CUSTODIA®

Фунгицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующих веществ:
азоксистробин, 120 г/л + тебуконазол, 200 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны.
Препарат малоопасен для пчел — 3-ий класс опасности.

Необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчел пестицидами», в т. ч. регламенты:

- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером; скорость ветра до 4–5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
- ограничение лёта пчел 3–24 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохранной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения.

Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпас скота на свежеработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10 метров по го-



ризонтالي от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности.

H302 — Вредно при проглатывании.

H361d — Предположительно может нанести ущерб нерождённому ребёнку.

H410 — Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.

P201 — Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.

P270 — Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.

P280 — Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P501 — Удалить содержимое/контейнер в установленном порядке.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



BELARUS



Рекомендации по применению*

Номер государственной регистрации: ГР 02-0228.

Сроки выхода: для проведения ручных работ — 7 суток, для проведения механизированных работ — 3 суток с момента применения.

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
0,75 – 1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз			
	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз			
	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость			
1,0 – 1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание растений в начале цветения ярового рапса (стадия 61 – 65). Расход рабочего раствора 300 л/га	30	1 – 2
					1
	Рапс яровой	Склеротиниоз			1

Рекомендации по применению

Норма расхода препарата, л/га	Культура, обрабатываемые объекты	Контролируемые объекты	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
1,0 – 1,2	Кукуруза	Пузырчатая головня	Опрыскивание в период вегетации	63	1
	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз		30	
	Подсолнечник масличный	Фльтернариоз, белая и серая гниль		34	

* согласно Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешённых к применению на территории Республики Беларусь.

Норма расхода рабочей жидкости для обработки зерновых культур 200 – 300 л/га, для борьбы с болезнями рапса 200 – 400 л/га.

Условия хранения

Хранить препарат в невскрытой заводской упаковке на складе для средств защиты растений, в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 0 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Ограничения по применению

Период защитного действия: 2 – 3 недели.

Скорость воздействия. Действующие вещества поглощаются ассимилирующими частями растения в течение 1 часа и распространяются акропетально по ксилеме растения, с этого момента начинается воздействие препарата на возбудителя болезни.

Совместимость с другими пестицидами. Кустодия не предназначена для применения в составе баковых смесей. В случае необходимости перед применением рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость.

Рекомендации по применению

Фитотоксичность. При использовании препарата в строгом соответствии с рекомендациями по применению не создается риска возникновения фитотоксичности.

Возможность варьирования культур в севообороте. Не ограничена при соблюдении рекомендованных регламентов применения препарата.

Возможность возникновения резистентности. Потенциальный риск развития резистентности к компонентам препарата Кустодия у возбудителей заболеваний рапса и зерновых культур маловероятен. Тем не менее, для предотвращения возникновения устойчивых популяций следует чётко соблюдать рекомендации в рамках антирезистентной стратегии: не понижать рекомендованные нормы расхода препарата, чередовать использование фунгицида Кустодия с препаратами на основе действующих веществ других химических классов.

Порядок приготовления рабочей жидкости. Перед использованием препарата тщательно взболтайте содержимое упаковки, добавьте рассчитанное и отмеренное количество в отдельную ёмкость с несколькими литрами воды, хорошо перемешайте. Заполните ½ бака опрыскивателя чистой водой, включите мешалку, добавьте маточный раствор в бак опрыскивателя. Дважды ополосните тару водой, промывную воду долейте в бак, объединив её с остальным раствором, продолжайте заполнение бака опрыскивателя с одновременным перемешиванием. Продолжайте перемешивание и во время обработки для обеспечения однородности рабочей смеси.

При применении препарата в баковой смеси с другими средствами защиты растений, добавляйте их в бак опрыскивателя в следующем порядке:

- 1) СП;
- 2) ВДГ;
- 3) Кустодия, КС;
- 4) ВЗ;
- 5) КЗ.

Каждый последующий препарат добавляется после полного растворения предыдущего. В случае применения в баковой смеси компонента в водорастворимой упаковке данный препарат растворить в баке опрыскивателя первым. Рабочий раствор баковой смеси должен быть использован в день приготовления. Не храните рабочий раствор препарата более 48 часов в баке опрыскивателя.

Меры предосторожности при работе, транспортировке и хранении

При использовании, транспортировке и хранении препарата следует соблюдать меры безопасности, принятые при обращении с пестицидами и изложенные в санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений».

Рекомендации по применению

Хранить препарат в местах, недоступных для посторонних лиц, детей, животных, отдельно от продуктов питания, кормов, питьевой воды.

Транспортировка допускается только в невскрытой заводской упаковке с этикеткой всеми видами транспортных средств согласно соответствующим правилам перевозки.

Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты. Рекомендуется использование соответствующей защитной одежды и обуви, плотно прилегающих защитных очков, защитных перчаток, при необходимости — респиратора или других средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Во время работы с препаратом нельзя принимать пищу, пить, курить. По окончании работы необходимо принять душ и переодеться. Защитная одежда подлежит стирке.

Способ обезвреживания просыпанного или пролившегося средства защиты растений

При проливе или утечке необходимо изолировать опасную зону и преградить доступ к ней посторонним. Собрать как можно большее количество жидкости, засыпать инертным адсорбирующим материалом (песок, земля или древесные опилки) до полного впитывания, затем собрать в специальный контейнер, снабжённый этикеткой. Загрязнённый сорбент и почву утилизировать в установленном порядке в местах, согласованных с территориальными природоохранными органами. Загрязнённую землю перекопать на глубину штыка лопаты. Не применять пролившийся препарат. В случае попадания препарата в водоёмы, источники питьевого водоснабжения или дренажные системы незамедлительно сообщить уполномоченным органам.

Способы обезвреживания, утилизации тары и остатков средства защиты растений

Промывные воды, тару, адсорбирующий материал и остатки пестицида утилизируют в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». После использования препарата трижды промыть пустую канистру водой. Промывные воды могут быть использованы для приготовления рабочего раствора этого же препарата. Тару и остатки утилизируют в соответствии с установленным порядком. Все мероприятия следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты. Запрещается пить, курить и принимать пищу во время работ. Запрещается использование тары для хранения пищевых продуктов, фуража и других бытовых нужд.

Меры первой помощи при отравлении

В случае аварии или при первых признаках отравления необходимо отстранить пострадавшего от работы, немедленно обратиться к врачу, показать паспорт безопасности на препарат, канистру или тарную этикетку. Оказывающему первую помощь: обеспечить самозащиту!

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание нарушено или остановилось, сделать искусственное дыхание. Вызвать врача.

При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды. После первоначальной обработки снять контактные линзы при их наличии и, не закрывая глаз, продолжить промывать их не менее 15 минут.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду обувь, немедленно промыть все загрязнённые участки кожи мылом и водой. При необходимости обратиться к врачу.

При случайном проглатывании: промыть полость рта. Выпить большое количество воды. При наличии симптомов отравления обратиться к врачу.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

Клиническая картина острых отравлений, рекомендации врачу

Специфического антидота нет. Проводить симптоматическое и поддерживающее лечение.

КУСТОДИЯ
CUSTODIA®

Фунгицид

Перед применением внимательно прочитайте!

Наименование и содержание действующих веществ: азоксистробин, 120 г/л + тебуконазол, 200 г/л.

Препаративная форма: концентрат суспензии.

Класс опасности: 3 (вещества умеренно опасные).

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны. Препарат малоопасен для пчел — 3-ий класс опасности.

- Необходимо соблюдать «Инструкцию по профилактике отравления пчёл пестицидами», в т.ч. регламенты:
- обработку растений проводить ранним утром или поздним вечером; скорость ветра до 4–5 м/с;
 - погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;
 - ограничение лёта пчел 3–24 часов.

Запрещается использовать препарат в водоохраной зоне поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения.

Не допускать загрязнения почвы, природных и технических водоемов, источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Запрещается выливать остатки препарата в канализацию. Избегать попадания препарата в корма, не допускать выпаса скота на свежее обработанных территориях. Запрещено применять препарат в границах прибрежных полос на расстоянии до 10



открыть здесь

метров по горизонтали от береговой линии поверхностных водных объектов, а также в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения.

Краткие характеристики опасности и меры предосторожности. H302 — Вредно при проглатывании.

H361d — Предположительно может нанести ущерб нерождённому ребёнку.

H410 — Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102 — Хранить в месте, недоступном для детей.

P201 — Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.

P270 — Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.

P280 — Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.

P501 — Удалить содержимое/контейнер в установленном порядке.

Телефон и адрес для экстренного обращения в случае отравления. Городская клиническая больница скорой медицинской помощи. 220115, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кижеватова, 58. Тел. + 375 (17) 287-00-90, +375 (17) 287-00-92.

UN 3082



BELARUS



Осторожно