


PIRIMOR®

Insecticide

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten

Efficace contre les pucerons, sélectif pour de nombreux prédateurs

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



ADAMA

Werkzame stof / Substance active:

Pirimicarb 50 %

Formulering / Formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: IRAC

1A

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 6640P/B

Numéro d'agrément Lux: L00717-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland / Pays Bas

www.adama.com

5 KG e

Pirimor® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

ANEPMBE5KG/03/A

L50B09IPFR_03

PRIMOR®

Insecticide

Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van 50% Pirimicarb
Erkenningsnummer: 6640P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H301: Giftig bij inslikken • **H317:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie • **H332:** Schadelijk bij inademing • **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker • **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelootsbescherming dragen • **P301 + P310:** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • **P304 + P340:** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen • **P308 + P313:** NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen • **P321:** Specifieke behandeling vereist (zie eerste hulp aanwijzingen op dit etiket) • **P330:** De mond spoelen • **P331:** Gelekt/smerste stof opzuigen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • **SPa:** Na de behandeling van de percelen/opervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd • **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van opgevoelwater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • **SPe8:** Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken • **SPe11:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1A.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkvaren en van diervoeder. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

UFI: 7M9M-5DIQ-RV0H-7X9F



www.agrirecover.eu

02757

8 718077 012605 >

BELGIË/
BELGIQUE

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant 50% Pirimicarb
Numéro d'agrément: 6640P/B
Numéro d'agrément Lux: L00717-073

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H301: Toxique en cas d'ingestion • **H317:** Peut provoquer une allergie cutanée • **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux • **H332:** Nocif par inhalation • **H351:** Susceptible de provoquer le cancer • **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage • **P301 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P304 + P340:** EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer • **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • **P308 + P313:** EN CAS D'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin • **P321:** Traitement spécifique (voir conseils de premiers secours sur cette étiquette) • **P330:** Rincer la bouche • **P331:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPa:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec • **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • **SPe8:** Dangereux pour les abeilles. Ne pas utiliser au moment où les abeilles sont actives • **SPe11:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1A.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Conservé hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.


GEVAAR/DANGER
/GEFAHR



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

ANEPNMBESLT/03/B

L508689IPBB_03

LUXEMBURG/
LUXEMBOURG

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

-

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Overweeg tot het nemen van een bloedmonster ter controle van cholinesterase activiteiten (gebruik een haparine buis) Atropinesulfaat toedienen als tegengif. Aangezien er geen therapeutisch effect is, is het gebruik van oxime preparaten (of andere cholinesterase reactivators) contra-indicatief.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in teelten waarin de principes van de geïntegreerde bestrijding worden toegepast. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttijd voor de oogst te verkorten.

Het product heeft geen onaantoonbare effecten op de natuurlijke vijanden van bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen.

Groenteteelten onder glas: het product kan samen ingezet worden met de meeste biologische bestrijdingsmiddelen, indien maximaal éénmaal om de twee maanden toegepast.

Fruitboomgaarden: het product kan gebruikt worden in de geïntegreerde bestrijding in fruitboomgaarden.

De soorten en variëteiten van sierplanten die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

Aalbessenstruiken (witte, rode, zwarte), veenbessen, blauwe/rode bosbessen, frambozenstruiken, bramenstruiken, stekelbes (kruisbes) en kruisingen (open lucht) (max 2 toepassingen per teelt)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*): 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van bloedluizen (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Aardappelpootgoedteelt (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*): 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Paprika/spaanse peper, aubergine/eierplant en pepino, komkommer, courgette/patisson, augurk, tomaten, meloen (Onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*): 0,32 kg/ha haag, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 1 dag, meloen: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen: /

Courgette/patisson, augurk (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*): 0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 1 dag

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Voederbieten, suikerbieten (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*): 0,35 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Voedererwten (drooggeogst), drooggeogste erwten (zonder peul), groengeogste erwten (met peul), groengeogste erwten (zonder peul) (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeogst, zonder peul/drooggeogst) (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeogst, met peul) (open lucht/onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,5 kg/ha haag (verticale teelt) of 0,4 kg/ha bodem (horizontale teelt), het gewas over maximaal 1,20 m hoogte behandelen, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek (open lucht)

Bloemkool (witte en groene), broccoli (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool), koolrabi (koolraap-boven-de-grond), koolraap, schorseneer, pastinaak, mierikswortel, wortelen, knolselder, rode biet (kroten), witloofwortelteelt, cichorei, spinazie, warmoes (snijbiet), aardappelen (Open lucht)

Radijs, rammenas en rettich (open lucht/onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek (open lucht)

Opmerking mierikswortel: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Slasoorten (open lucht/onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn (open lucht): 7 dagen

Veiligheidstermijn (onder bescherming): vanaf 1/3 tot 31/10: 14 dagen,
vanaf 1/11 tot 28/2: 28 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met
klassieke techniek (open lucht)

Raap (stoppelraap, meiraap) (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,3 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met
klassieke techniek

Knolvenkel (Onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-3 toepassingen met een interval van 21 dagen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: /

Peterselie, dille, kervel, engelwortel, koriander, lavas, maggiplant, bieslook (consumptie bladeren), wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels), rucola (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met
klassieke techniek

Opmerking: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een
test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Peterselie, dille, kervel, koriander, lavas, maggiplant, bieslook, snijselder, roomse kervel, salie, rozemarijn, tijm, marjolein/oregano, citroenmelisse, basilicum, munt, laurier, dragon (consumptie bladeren) (onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 10 dagen

Risicobeperkende maatregelen: /

Opmerking: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een
test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Snijselder, roomse kervel, salie, rozemarijn, tijm, marjolein/oregano, citroenmelisse, basilicum, munt, laurier, dragon (consumptie bladeren) (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 toepassing

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met
klassieke techniek

Opmerking: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een
test te doen op enkele plantjes alvorens het volledige veld te behandelen.

Aardbeiplanten (productieveld, selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht/onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen (open lucht)

0,4 kg/ha, 1 toepassing (onder bescherming)

Veiligheidstermijn (productieveld): 3 dagen (open lucht), 7 dagen (onder bescherming)

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek (open lucht)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht/onder bescherming)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

50 g/100 l

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek (open lucht)

Zomertarwe, wintertarwe, zomergerst, wintergerst, winterrogge, zomerrogge, zomerhaver, winterhaver, winterspelt, zomerspelt, wintertriticale, zomertriticale (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,25 kg/ha, 1-2 toepassingen, maar enkel in geval van zware aantasting.

Veiligheidstermijn: 35 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Appel-, peren-, abrikozen-, perzik-, nectarine- en pruimenbomen (open lucht) (max 2 toepassingen per teelt)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van bloedluizen (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha haag, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 3 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Kersen- en kriekbomen (open lucht) (max 2 toepassingen per teelt)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen

Ter bestrijding van bloedluizen (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha haag, 1-2 toepassingen, met toevoeging van een hiervoor erkende uitvloeier, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Spruitkool (open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen:

Veiligheidstermijn: 4 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Selderij (bleek-, groene en witte), knolvenkel (Open lucht)

Ter bestrijding van bladluizen (*Aphididae*/*Lachnidae*/*Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 toepassingen

Veiligheidstermijn: 14 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder

goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

-
-

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Faire un prélèvement de sang pour déterminer l'activité cholinestérasique sanguine (utiliser un tube à héparine). Administrer du sulfate d'atropine comme antidote. Vu l'absence d'effets thérapeutiques, l'utilisation de préparations d'oximes (ou autre reactivants de cholinestérase) est contre-indiquée.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg:
(+352) 8002 5500.

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les cultures gérées selon les principes de la lutte intégrée. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur les ennemis naturels des pucerons et les autres arthropodes utiles, à l'exception des syrphes.

Cultures maraîchères sous verre: le produit peut être associé en même temps que la plupart des pesticides biologiques s'il est appliqué maximum 1 fois tous les 2 mois.

Arboriculture fruitière: le produit peut être appliqué dans la lutte intégrée en arboriculture fruitière.

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agréation.

Groseilliers (blancs, rouges, cassis), aînelles canneberges, myrtilliers et aîelliers rouges, framboisiers, ronces (mûres), groseilliers à maquereau et hybrides (plein air) (max 2 applications/culture)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,5 kg/ha de haie, 1-2 applications

Pour lutter contre pucerons lanigères (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha de haie, en ajoutant un mouillant agréé à cet effet, 1-2 applications

Délai avant récolte: 3 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique

Culture de plants de pommes de terre (plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 applications

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Poivron/piment, aubergine et pépinos, concombre, courgette/patisson, cornichon, tomate, melon (Sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,32 kg/ha de haie, 1-2 applications

Délai avant récolte: 1 jour, melon: 3 jours

Mesures de réduction du risque: /

Courgette/patisson, cornichon (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 1 jour

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Betteraves fourragères, betteraves sucrières (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,35 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Pois fourragers (récoltés secs), pois récoltés secs (sans cosse), pois verts (avec cosse) (mange-tout), petit pois (sans cosse) (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse/ récoltées sèches) (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Haricot vert (récolté frais, avec cosse) (plein air/sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,5 kg/ha de haie (culture verticale) ou

0,4 kg/ha de sol (culture horizontale), traiter la culture sur max. 1,20 mètre de hauteur, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique (plein air)

Chou-fleur (blanc et vert), chou brocoli (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie), chou-rave, chou-navet, rutabaga, scorsonère, panais, raifort, carottes, céleri-raves, betterave rouge, culture de racines de witloof, chicorée, épinard, bette, pommes de terre (Plein air)

Radis, radis noir et radis rave (plein air/sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):
0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique (plein air)

Remarque raifort: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Laitues (plein air/sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 application

Délai avant récolte (plein air): 7 jours

Délai avant récolte (sous protection): du 1/3 jusqu'au 31/10: 14 jours, du 1/11 jusqu'au 28/2: 28 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique (plein air)

Navet (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,3 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Fenouil (Sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-3 applications à intervalle de 21 jours

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: /

Persil, aneth, cerfeuil, angélique, coriandre, livèche, ciboulette (consommation des feuilles), persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine), roquette (plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 application

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Persil, aneth, cerfeuil, coriandre, livèche, ciboulette, céleri à couper, cerfeuil musqué, sauge officinale, romarin, thym, origan/marjolaine, melisse, basilic, menthe, laurier, estragon (consommation des feuilles) (sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 application

Délai avant récolte: 10 jours

Mesures de réduction du risque: /

Remarque: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Céleri à couper, cerfeuil musqué, sauge officinale, romarin, thym, origan/marjolaine, mélisse, basilic, menthe, laurier, estragon (consommation des feuilles) (plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1 application

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Fraisiers (champ de production/champ de sélection et de multiplication) (plein air/sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 applications (plein air)

0,4 kg/ha, 1 application (sous protection)

Délai avant récolte (champ de production): 3 jours (plein air), 7 jours (sous protection)

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique (plein air)

Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (plein air/sous protection)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

50 g/100 l

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique (plein air)

Froment de printemps, froment d'hiver, orge de printemps, orge d'hiver, seigle d'hiver, seigle de printemps, avoine de printemps, avoine d'hiver, épeautre de printemps, épeautre d'hiver, triticale d'hiver, triticale de printemps (plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,25 kg/ha, 1-2 applications, mais uniquement en cas de forte infestation

Délai avant récolte: 35 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Pommiers, poiriers, abricotiers, pêchers/nectariniers, pruniers (plein air) (max 2 applications/culture)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,5 kg/ha de haie, 1-2 applications

Pour lutter contre pucerons lanigères (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha de haie, en ajoutant un mouillant agréé à cet effet, 1-2 applications

Délai avant récolte: 3 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique

Cerisiers et griottiers (plein air) (max 2 applications/culture)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,5 kg/ha de haïe, 1-2 applications

Pour lutter contre pucerons lanigères (*Eriosoma*): 0,5 kg/ha de haïe, en ajoutant un mouillant agréé à cet effet, 1-2 applications

Délai avant récolte: 7 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 3 m avec technique classique

Chou de Bruxelles (plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 applications:

Délai avant récolte: 4 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Céleri (à côtes, blanc et vert), fenouil (Plein air)

Pour lutter contre pucerons (*Aphididae/Lachnidae/Callaphididae*):

0,4 kg/ha, 1-2 applications

Délai avant récolte: 14 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.

-

GEFAHRENHINWEISE & SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHRENHINWEISE

- H301: Giftig bei Verschlucken.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

- P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
- P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
- P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308 + P311: BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P321: Besondere Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330: Mund ausspülen.
- P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
- SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPe8: Gefährlich für Bienen. Dieses Produkt nicht verwenden an Orten, an denen Bienen aktiv nach Nahrung suchen.
- SPa1: Um Resistenzentwicklung zu vermeiden, dürfen Sie dieses Produkt mit Produkten mit einem anderen Wirkungsmechanismus abwechseln. Der IRAC-Code für den Wirkungsmechanismus des Wirkstoffs dieses Produkts ist 1A.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN


- EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



PIRIMOR®

Insecticide

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten
Efficace contre les pucerons, sélectif pour de nombreux prédateurs



Werkzame stof / Substance active:

Pirimicarb 50 %

Formulering / Formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /
Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: IRAC 1A

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 6640P/B

Numéro d'agrément Lux: L00717-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 KG

Pirimor® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



Water dispergeerbaar granulaat (WG) op basis van
50% Pirimicarb. Erkenningsnummer: 6640P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H301: Giftig bij inslikken ● H317: Kan een allergische
huidreactie veroorzaken ● H319: Veroorzaakt
ernstige oogirritatie ● H332: Schadelijk bij
inademing ● H351: Verdacht van het veroorzaken
van kanker ● H410: Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel vermijden ● P280: Beschermende
handschoenen, beschermende kleding,
oogbescherming en gelaatsbescherming dragen
● P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● P302 + P352:
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
● P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in
de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen ● P305 + P351 + P338:
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen ● P308 + P311: NA (mogelijke) blootstelling:
een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen ● P321:
Specifieke behandeling vereist (zie eerste hulp
aanwijzingen op dit etiket) ● P330: De mond spoelen
● P391: Gelekte/gemorste stof opruimen ● SP1: Zorg
ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
water verontreinigt ● SPo: Na de behandeling van de
percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd ● SPe3: Om in het
water levende organismen te beschermen mag u in
een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater
niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen)
● SPe8: Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product
niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel
zoeken ● SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen
moet u dit product afwisselen met producten met een
ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het
werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit
product is 1A.

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Containers goed gesloten bewaren op een droge,
koele en goed geventileerde plaats. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Verwijderd houden van eet-
en drinkwaren en van diervoeder. De verpakking
mag niet worden hergebruikt.

Granulés à disperser dans l'eau (WG) contenant
50% Pirimicarb

UN 2757



8 718077 012612 >



www.agrirecover.eu

Numéro d'agrément: 6640P/B
Numéro d'agrément Lux: L00717-073

Respectez les instructions d'utilisation pour
éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H301: Toxique en cas d'ingestion ● H317: Peut
provoquer une allergie cutanée ● H319: Provoque une
sévère irritation des yeux ● H332: Nocif par inhalation
● H351: Susceptible de provoquer le cancer ● H410:
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/
brouillards/ vapeurs/aérosols ● P280: Porter des
gants de protection, des vêtements de protection,
un équipement de protection des yeux et du visage
● P301 + P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin ● P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC
LA PEAU: Laver abondamment à l'eau ● P304 + P340:
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à
l'extérieur et la maintenir dans une position où elle
peut confortablement respirer ● P305 + P351 + P338:
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à
rincer ● P308 + P311: EN CAS d'exposition prouvée
ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin ● P321: Traitement spécifique (voir conseils
de premiers secours sur cette étiquette) ● P330:
Rincer la bouche ● P391: Recueillir le produit répandu
● SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son
emballage ● SPo: Ne pas pénétrer dans des cultures/
surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation
ne soit complètement sec ● SPe3: Pour protéger
les organismes aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures
de réduction du risque) ● SPe8: Dangereux pour les
abeilles. Ne pas utiliser au moment où les abeilles
sont actives ● SPa1: Pour éviter le développement
de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec
d'autres ayant un mode d'action différent. Le code
IRAC pour le mode d'action de la substance active de
ce produit est 1A.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Garder les récipients bien fermés dans un
endroit sec, frais et bien ventilé.
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver à l'écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux.
L'emballage ne doit pas être réutilisé.

UFI: 7M9M-5D1Q-RV0H-7X9F



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBOURG/
LUXEMBOURG

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und
Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE


H301: Giftig bei Verschlucken ● H317: Kann
allergische Hautreaktionen verursachen ● H319:
Verursacht schwere Augenreizung ● H332:
Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● H351: Kann
vermutlich Krebs erzeugen ● H410: Sehr giftig für
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/
Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden ● P280:
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz und Gesichtsschutz tragen ●
P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen ● P302
+ P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser waschen ● P304 + P340: BEI EINATMEN:
Die Person an die frische Luft bringen und für
ungehinderte Atmung sorgen ● P305 + P351 + P338:
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter spülen ● P308 + P311: BEI Exposition oder
falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt anrufen ● P321: Besondere Behandlung
(siehe Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem
Kennzeichnungsetikett) ● P330: Mund
ausspülen ● P391: Verschüttete Mengen
aufnehmen ● SP1: Mittel und/oder dessen
Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ●
SPo: Das behandelte Gewächs/die behandelte
Fläche erst nach Trocknen des Spritzbelages
wieder betreten ● SPe3: Zum Schutz von
Gewässerorganismen eine unbehandelte
Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten.
(Siehe Risikominierungsmaßnahmen) ●
SPe8: Gefährlich für Bienen. Dieses Produkt
nicht verwenden an Orten, an denen Bienen
aktiv nach Nahrung suchen ● SPa1: Um
Resistenzentwicklung zu vermeiden, dürfen Sie
dieses Produkt mit Produkten mit einem anderen
Wirkungsmechanismus abwechseln. Der
IRAC-Code für den Wirkungsmechanismus des
Wirkstoffs dieses Produkts ist 1A.

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch
und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



GEVAAR/
DANGER/
GEFAHR

ANEPMBESLT/03/C/2

L50A070CBR_03

PIRIMOR®

Insecticide

Effectief tegen luizen, selectief voor veel nuttige insecten

Efficace contre les pucerons, sélectif pour de nombreux prédateurs

Werkzame stof / Substance active:

Pirimicarb 50 %

Formulering / Formulation:

Water dispergeerbaar granulaat /

Granulés à disperser dans l'eau (WG)

Resistentiecode / Groupe de résistance: IRAC 1A

Erkenningsnr. / No. d'agrément: 6640P/B

Numéro d'agrément Lux: L00717-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN, Nederland / Pays Bas

www.adama.com

Pirimor® is een geregistreerd handelsmerk van /
est une marque déposée de ADAMA Celsius B.V., Curaçao Branch

4 x 5 KG

L50&50CFR_03 ANEPRMBESLT/03/C1

PIRIMOR®

PIRIMOR®



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBURG/LUXEMBOURG




GEVAAR / DANGER / GEFAHR

ANEPRMBE5LT/03/X

L50889PAAR_03

18 x 20 KG



UN 2757

ADAMA

Northern Europe B.V.

