



Maxentis®

T1 / T2 fungicide
Plug en Spray



FUNGICIDE



MAXENTIS[®]

T1 / T2 fungicide
Plug en Spray

Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe
Wintergerst, zomergerst
Winterrogge, zomerrogge
Winterspelt, zomerspelt
Wintertriticale, zomertriticale
Winterkoolzaad, zomerkoolzaad

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Septoria (<i>Septoria tritici</i>)	1 l/ha, 1 toepassing
Gele roest (<i>Puccinia striiformis</i>)	
Bruine roest (<i>Puccinia recondita</i>)	
Echte meeldauw (<i>Erysiphe betae</i>)	
Fusarium (<i>Fusarium</i> spp.)	
Netvlekkenziekte (<i>Pyrenophora</i> / <i>Helminthosporium</i> / <i>Drechslera</i>)	
Dwergroest (<i>Puccinia hordei</i>)	
Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>)	

Actieve stoffen

200 g/l azoxystrobin
150 g/l prothioconazool

Formuleringstype

Suspensie concentraat (SC)

Verpakkingsgrootte

5 liter

Ons advies

In granen kan Maxentis[®] worden gebruikt als een T1- of T2 toepassing in een spuitschema met andere fungiciden, of solo.

Meer details? Scan hier



Effectiviteit van Maxentis®

Maxentis® in gerst

Proeven 2018-2024




Maxentis® in tarwe

Proeven 2018-2024



Positionering van Maxentis®

Maxentis® fungicide kan worden toegepast in tarwe vanaf begin strekking (BBCH30 – BBCH 32) tot volle bloei (BBCH69). In gerst kan Maxentis® worden toegepast vanaf begin strekking tot volle bloei (BBCH65). Aan te passen aan de ziektedruk en de gevoeligheid van het ras.






Stavento® toevoegen voor meerwaarde

In granen adviseren wij de toevoeging van Stavento® in het schema.

Stavento® geeft meerwaarde:

- Stavento® beschermt actieve stoffen voor resistentievorming.
- Stavento® verlengt de periode van groen blad.

Hieronder staan de proefresultaten van Stavento® op zowel de T1 als de T2, als beide behandelingen.



Bron: ADAMA proefresultaten uit België, Nederland en Engeland

In tarwe duiden de Stavento® proeven aan dat er goede effectiviteit is op septoria.

In gerst is Stavento® dé referentie tegen ramularia. Gebruik 1,5 liter per hectare.

Stavento® mag 1 tot 2 keer toegepast worden. Voor meer informatie benadert u uw adviseur.



Voegt waardevolle effectiviteit toe tegen Septoria en Ramularia



Verlengt de periode van groen blad



Significant rendement op de investering



Resistentiemanagement om effectiviteit van single-sites te beschermen





FUNGICIDE



ADAMA

STAVENTO®

De essentiële multi-dite fungicide:
Duurzame beheersing van graanziekten



Geregistreerde gewassen

Wintertarwe, zomertarwe
Wintergerst, zomergerst

Ons advies

Wij adviseren Stavento in te zetten op zowel de T1, als de T2 voor het beste resultaat. Gebruik 1,5 liter per hectare Stavento voor maximaal 2 behandelingen.

Ter beheersing van

Beheersing van	Toepassingsdosis per behandeling
Septoria (Septoria tritici)	1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 - 14 dag(en) tussen twee toepassingen
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)	
Netvlekkenziekte (Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera)	
Ramularia (Ramularia collo-cygni)	

Actieve stof

500 g/l folpet

Formuleringstype

Suspensieconcentraat (SC)

Verpakkingsgrootte

5 liter

Meer details? Scan hier





Listen ► Learn ► Deliver

We zijn erg enthousiast om onze producten in de markt over heel België tot leven te zien komen. Als u vragen heeft over het spuitschema, de positionering van het product of andere vragen, neem dan contact op met:



Guy Vroman

Technical Support Manager | Sales
M. +32 473236801
guy.vroman@adama.com



Herbrecht Muys

Key Account Manager Belgium Luxembourg | Sales
M. +32 460 97 41 55
herbrecht.muys@adama.com



ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK, Leusden, Nederland
+31 33 205 6800 | info.ane@adama.com | adama.com