



ADAMA



Maxentis[®]

T1 / T2 fongicide
Brancher et Appliquer



MAXENTIS®

T1 / T2 fongicide
Brancher et Appliquer

Cultures

Froment d'hiver, froment de printemps
Orge d'hiver, orge de printemps
Seigle d'hiver, seigle de printemps
Triticale d'hiver, triticale de printemps
Épeautre d'hiver, épeautre de printemps
Colza d'hiver/navette d'hiver, colza de
Printemps/navette de printemps

Cibles principales

Cibles principales	Dose d'application par traitement
Septoriose des feuilles (<i>Septoria tritici</i>)	1 l/ha, 1 application
Rouille jaune (<i>Puccinia striiformis</i>)	
Rouille brune (<i>Puccinia recondita</i>)	
Oïdium (<i>Erysiphe graminis</i>)	
Fusariose (<i>Fusarium spp.</i>)	
Rouille naine (<i>Puccinia hordei</i>)	
Helminthosporiose (<i>Pyrenophora / Helminthosporium / Drechslera</i>)	
Rhynchosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	

Matières actives

200 g/l azoxystrobine
150 g/l prothioconazole

Type de formulation

Suspension concentrée (SC)

Taille d'emballage

5 litre

Notre conseil

Maxentis® peut être utilisé en T1 ou en T2, seul ou en mélange.


Plus de détails ?
Scannez ici






Efficacité d'Maxentis®

Efficacité en froment




Efficacité en orge



Positionnement de Maxentis®

D'une grande souplesse, Maxentis® est un fongicide qui peut être appliqué depuis le début de la montaison (BBCH30 – BBCH 32) jusqu'à la floraison sur blé (BBCH69) et jusqu'à l'épiaison sur orge (BBCH59).






Ajouter Stavento® pour une valeur ajoutée

Pour les céréales, nous recommandons Stavento® dans le programme.

Les avantages de Stavento®:

- Stavento® améliore l'efficacité contre les souches de septoriose résistantes
- Stavento® améliore l'efficacité du programme fongicide

Vous trouverez ci-dessous les résultats des essais de Stavento® sur T1 et T2, ainsi que sur les deux traitements.



Source : résultats des essais ADAMA en Belgique, aux Pays-Bas et en Angleterre

En froment, les essais Stavento® indiquent une bonne efficacité contre la septoriose. En orge, Stavento® est la référence contre la ramulariose. Utilisez 1,5 litre par hectare. Stavento® peut être appliqué 1 à 2 fois. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre conseiller.



Ajoute une efficacité précieuse contre la septoriose et la ramulariose



Prolonge la période de feuillage vert



Retour sur investissement significatif



Gestion de la résistance pour protéger l'efficacité des sites uniques





FUNGICIDE



ADAMA

STAVENTO®

Plus de rendement pour vos céréales!



Cultures

Froment d'hiver, froment de printemps
Orge d'hiver, orge de printemps

Notre conseil

Nous recommandons d'utiliser Stavento à la fois au T1 et au T2 pour obtenir les meilleurs résultats. Utilisez 1,5 litre par hectare de Stavento pour un maximum de 2 traitements.

Cibles principales

Cibles principales	Dose d'application par traitement
Septoriose des feuilles (<i>Septoria tritici</i>)	} 1,5 l/ha, 1-2 applications avec un intervalle de 7 - 14 jour(s) entre deux applications
Rhynchosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	
Helminthosporiose (<i>Pyrenophora/Helminthosporium/Drechslera</i>)	
Ramulariose de l'orge (<i>Ramularia collo-cygni</i>)	

Matières actives

500 g/l folpet

Type de formulation

Suspension concentrée (SC)

Taille d'emballage

5 litre

Plus de détails ?
Scannez ici





Listen ▶ Learn ▶ Deliver

Si vous avez des questions concernant le programme de pulvérisation,
le positionnement du produit, veuillez contacter :



Guy Vroman

Technical Support Manager | Sales
M. +32 473236801
guy.vroman@adama.com



Herbrecht Muys

Key Account Manager Belgium Luxembourg | Sales
M. +32 460 97 41 55
herbrecht.muys@adama.com



ADAMA Northern Europe B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK, Leusden, Pays-Bas
+31 33 205 6800 | info.ane@adama.com | adama.com