

TRIADE® TWIN

Herbicide

Scan voor gebruik/
Scanner pour
l'utilisation



Werkzame stof/Substance active:

Ethofumesaat/Ethofumesate 200 g/L

(19,8 % w/w)

Fenmedifam/Phenmediphame 200 g/L

(19,6 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension
concentrée (EC)

Resistentiecode/Groupe de résistance:

HRAC N, C1

Erkenningsnr./No. d'agrégation: 10962P/B

**Toelatingshouder/Détenteur de
l'agrégation:**

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com



5 L e

Triade® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.

ANETDTE5LT/02/A

L10566IPFR_02

TRIADE® TWIN



Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Ethofumesaat en 200 g/L Fenmedifam
Erkenningsnummer: 10962P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden • **P280:** Draag beschermende handschoenen en
beschermende kleding • **P302 + P352:** BIJ CONTACT MET DE
HUID: met veel water wassen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie
of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof
opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het water
levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren. De
verpakking mag niet worden hergebruikt.



www.agrirecover.eu

UN 3082



BELGIË/BELGIQUE

Suspension concentrée (SC) contenant
200 g/L Ethofumesate et 200 g/L Phenmedipham
Numéro d'agrément: 10962P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • **H410:** Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/
vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection
et des vêtements de protection • **P302 + P352:** EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P333**
+ **P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter
un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne
pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPe3:**
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de
réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le
récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

**WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG**



TRIADE® TWIN



hier openen / ouvrir ici



Herbicide

Suspensie concentraat (SC) op basis van
200 g/L Ethofumesaat en 200 g/L Fenmedifam
Erkenningsnummer: 10962P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke
gezondheid en het milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken • **H410:**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
vermijden • **P280:** Draag beschermende handschoenen en
beschermende kleding • **P302 + P332:** BIJ CONTACT MET DE
HUID: met veel water wassen • **P333 + P313:** Bij huidirritatie
of uitslag: een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/gemorste stof
opruimen • **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt • **SPe3:** Om in het water
levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone
ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan. Vorstvrij bewaren.
De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Suspension concentrée (SC) contenant
200 g/L Ethofumesate et 200 g/L Phenmedipham
Numéro d'agrément: 10962P/B

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H317: Peut provoquer une allergie cutanée • **H410:** Très
toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/
vapeurs/aérosols • **P280:** Porter des gants de protection
et des vêtements de protection • **P302 + P352:** EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau • **P333**
+ **P313:** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter
un médecin • **P391:** Recueillir le produit répandu • **SP1:** Ne
pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • **SPe3:**
Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone
non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de
réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter
les risques pour la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé. Ne jamais laisser le
récipient ouvert. Conserver à l'abri du gel.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.



UN 3082



NEDERLANDS

FRANÇAIS

DEUTSCH

STOFFEN IN HET MENGSEL DIE BIJDAGEN TOT DE INDELING VAN HET MENGSEL

1,2-benzisothiazolin-3-on, Index 613-088-00-6

EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatisch behandelen

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245245.

GEBRUIK & DOSIS

DOSES

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Suikerbieten, voederbieten (open lucht)

Toepassingsstadium: Kiemlobstadium - 8 bladeren (BBCH 10-18)

Ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden: 2,5 L/ha, eventueel gefractioneerd toedienen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Opmerking:

- max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden
- max. 1000 g ethofumesaat/ha/36 maanden

Algemene opmerking:

- Bij koud en bewolkt weer is het aangeraden een uitvloeier of emulgeerbare olie toe te voegen.
- Het is aangeraden de spuitoplossing op het veld te bereiden en niet te werken met een concentratie aan commercieel product lager dan 1%.

LEGE VERPAKKINGEN EN SPIUTOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geleidelijke verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen speelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen.

Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

LES SUBSTANCES CONTENUES DANS LE MÉLANGE QUI CONTRIBUENT À LA CLASSIFICATION DU MÉLANGE

1,2-benzisothiazolin-3-one, Index 613-088-00-6

CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245

EMPLOI & DOSE

DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Betteraves sucrières, betteraves fourragères (Plein air)

Stade d'application: Cotylédons - 8 feuilles (BBCH 10-18)

Pour lutter contre dicotylées annuelles: 2,5 L/ha, éventuellement fractionné

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique

Remarque:

- max. 960 g phenmediphame/ha/12 mois

- max. 1000 g éthofumésate/ha/36 mois

Remarque générale:

- Par temps froid et couvert, il est recommandé d'ajouter un mouillant ou une huile émulsionnable.

- Il est conseillé de préparer la bouillie de pulvérisation sur le champ et de ne pas travailler à une concentration inférieure à 1% en produit commercial.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

IN DEM GEMISCH ENTHALTENEN STOFFE, DIE ZUR EINSTUFUNG DES GEMISCHES BEITRAGEN.

1,2-benzisothiazolin-3-one, Index 613-088-00-6

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPe3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen).

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

TRIADE® TWIN

Herbicide

Werkzame stof/Substance active:

Ethofumesaat/Ethofumesate 200 g/L (19,8 % w/w)

Fenmedifam/Phenmediphame 200 g/L (19,6 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension concentrée (EC)

Resistentiecode/Groupe de résistance:

HRAC N, C1

Erkenningsnr./No. d'agrément: 10962P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Triade® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.



ADAMA

L105660CFR_02 ANETDTE5LT/02/C1

TRIADE® TWIN

TRIADE® TWIN

Herbicide



Werkzame stof/Substance active:

Ethofumesaat/Ethofumesate 200 g/L (19,8 % w/w)

Fenmedifam/Phenmediphame 200 g/L (19,6 % w/w)

Formulering/Formulation:

Suspensie concentraat/Suspension concentrée (EC)

Resistentiecode/Groupe de résistance:

HRAC N, C1

Erkenningsnr./No. d'agrément: 10962P/B

Toelatingshouder/Détenteur de l'agrément:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN,

Nederland/Pays Bas

www.adama.com

4 x 5 L

Triade® is een geregistreerd handelsmerk van/
est une marque déposée de ADAMA Agan Ltd.

Suspensie concentraat (SC) op basis
van 200 g/L Ethofumesaat en
200 g/L Fenmedifam
Erkenningsnummer: 10962P/B

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar
voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje

GEVARENAANDUIDINGEN

H317: Kan een allergische huidreactie
veroorzaken • **H410:** Zeer giftig voor
in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261: Inademing van stof/rook/gas/
nevel/damp/spuitnevel vermijden
• **P280:** Draag beschermende
handschoenen en beschermende
kleding • **P302 + P352:** BIJ CONTACT
MET DE HUID: met veel water wassen •
P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag:
een arts raadplegen • **P391:** Gelekte/
gemorste stof opruimen • **SP1:** Zorg
ervoor dat u met het product of zijn
verpakking geen water verontreinigt
• **SPe3:** Om in het water levende
organismen te beschermen mag u
in een bufferzone ten opzichte van
oppervlaktewater niet behandelen (zie
risicobeperkende maatregelen).

ANDERE VERMELDINGEN

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om
gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen.

HANTEREN EN OPSLAG

Nooit de verpakking open laten staan.
Vorstvrij bewaren. De verpakking mag
niet worden hergebruikt.

Scan voor gebruik /
Scanner pour
l'utilisation



UN 3082



8 718077 007458

Suspension concentrée (SC) contenant
200 g/L Ethofumesate et
200 g/L Phenmediphame
Numéro d'agrément: 10962P/B

Respectez les instructions d'utilisation
pour éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement.

Pour l'emploi: voir la notice

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

H317: Peut provoquer une allergie
cutanée • **H410:** Très toxique pour les
organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE

P261: Éviter de respirer les poussières/
fumées/gaz/brouillards/vapeurs/
aérosols • **P280:** Porter des gants de
protection et des vêtements de
protection • **P302 + P352:** EN CAS
DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver
abondamment à l'eau • **P333 + P313:** En
cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
Consulter un médecin • **P391:** Recueillir
le produit répandu • **SP1:** Ne pas polluer
l'eau avec le produit ou son emballage
• **SPe3:** Pour protéger les organismes
aquatiques, respecter une zone non
traitée par rapport aux eaux de surface
(voir mesures de réduction du risque).

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401: Respectez les instructions
d'utilisation pour éviter les risques pour
la santé humaine et l'environnement.

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

L'emballage ne doit pas être réutilisé.
Ne jamais laisser le récipient ouvert.
Conserver à l'abri du gel.



Zur Vermeidung von Risiken für Mensch
und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H317: Kann allergische Hautreaktionen
verursachen • **H410:** Sehr giftig für
Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISE

P261: Einatmen von Staub/Rauch/
Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden
• **P280:** Schutzhandschuhe und
Schutzbekleidung tragen • **P302 + P352:**
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit
viel Wasser waschen • **P333 + P313:**
Bei Hautreizung oder -ausschlag:
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe
hinanziehen • **P391:** Verschüttete
Mengen aufnehmen • **SP1:** Mittel
und/oder dessen Behälter nicht in
Gewässer gelangen lassen • **SPe3:**
Zum Schutz von Gewässerorganismen
eine unbehandelte Pufferzone zu
Oberflächengewässer einhalten.
(Siehe Risikominderungsmaßnahmen)

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH401: Zur Vermeidung von Risiken
für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten.

WAARSCHUWING /
ATTENTION /
ACHTUNG



ANETDIBESLT/02/C2

L105660CBR_02

TRIADE[®] TWIN



BELGIË/BELGIQUE



WAARSCHUWING/ATTENTION/ACHTUNG

30 x 20 L



UN 3082

ANETRDTE5LT/01/X

L10563PAAR_02

ADAMA
Northern Europe B.V.

