



© ADAMA Agan Ltd.

Emulgeerbaar concentraat/
concentré émulsionnable
(EC)



HERBICIDE/
HERBICIDE



Werkzame stof/Substance active

- Propaquizafop/Propaquizafop
..... 100 g/L (9,6% w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation:
8514P/B

No. d'agrégation Lux: L02190-073

Toelatingshouder / Détenteur de
l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,
Nederland/Pays-Bas
Tel. +31 33 205 68 00
www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/
No. du Lot & date de production: voir l'emballage



Scan voor gebruik /
Scanner pour l'utilisation



TRACEABIL-
ITY PRINTING
51/58 x 27 mm

1LE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de
luchtweegen terecht komt • H319: Veroorzaakt ernstige
oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H351:
Verdacht van het veroorzaken van kanker • H411: Giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P101: Bij het innemen van medisch advies, de verpak-
king of het etiket ter beschikking houden • P261: Inade-
ming van damp en spuitnevel vermijden • P280: Draag
beschermende handschoenen, beschermende kleding
en oogbescherming • P301 + P330 + P331 + P310: NA
INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwe-
ken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET
DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk. Blijven spoelen • P308 + P311: NA (mogelijke)
blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raad-
plegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1:
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking
geen water verontreinigt • SPa1: Om resistentieopbouw
te voorkomen moet u dit product afwisselen met pro-
ducten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC
code voor het werkingsmechanisme van de werkzame
stof van dit product is 1 • SPe3: Om in het water levende
organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten
opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risi-
cobeperkende maatregelen) • SPo: Na de behandeling
de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat
de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken • EUH208: Bevat propaqui-
zafop. Kan een allergische reactie veroorzaken •
EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de
menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp
niet inademen. In goed gesloten originele verpakking
bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileer-
de ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétra-
tion dans les voies respiratoires • H319: Provoque une
sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation •
H351: Susceptible de provoquer le cancer • H411: Toxi-
que pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette • P261: Éviter de
respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation •
P280: Porter des gants de protection, des vêtements de
protection et un équipement de protection des yeux •
P301 + P330 + P331 + P310: EN CAS D'INGESTION: Rincer
la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement
le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P305 + P351 +
P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer •
P308 + P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P391:
Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau
avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter
le développement de résistance, alterner l'emploi de
ce produit avec d'autres ayant un mode d'action
différent. Le code HRAC pour le mode d'action de
la substance active de ce produit est 1 • SPe3: Pour
protéger les organismes aquatiques, respecter une
zone non traitée par rapport aux eaux de surface
(voir mesures de réduction du risque) • SPo: Ne pas
pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant
que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement
sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessè-
chement ou gerçures de la peau • EUH208: Con-
tient du propaquizafop. Peut produire une réaction
allergique • EUH401: Respectez les instructions
d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé
humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est nécessaire.
Ne pas respirer les vapeurs. Conserver dans son embal-
lage d'origine hermétiquement fermé. Stocker dans un
endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas
être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die
Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und
Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

GROEP 1 HERBICIDE
GROUPE 1 HERBICIDE

UN3082

03_PWB_I791711



GEVAAR
DANGER
GEFAHR

UFI: QWVN-C2AA-100M-5NEF



8

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt ● **H319:** Veroorzaakt ernstige oogirritatie ● **H332:** Schadelijk bij inademing ● **H351:** Verdacht van het veroorzaken van kanker ● **H411:** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden ● **P261:** Inademing van damp en spuitnevel vermijden ● **P280:** Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming ● **P301 + P330 + P331 + P310:** NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P305 + P351 + P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen ● **P308 + P311:** NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen ● **P391:** Gelekte/gemorste stof opruimen ● **SP1:** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt ● **SPa1:** Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1 ● **SPe3:** Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen) ● **SPo:** Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken ● **EUH208:** Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken ● **EUH401:** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ● **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux ● **H332:** Nocif par inhalation ● **H351:** Susceptible de provoquer le cancer ● **H411:** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette ● **P261:** Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation ● **P280:** Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux ● **P301 + P330 + P331 + P310:** EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin ● **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer ● **P308 + P311:** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin ● **P391:** Recueillir le produit répandu ● **SP1:** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage ● **SPa1:** Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1 ● **SPe3:** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) ● **SPo:** Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau ● **EUH208:** Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique ● **EUH401:** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est nécessaire. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe Gebrauchsanleitung.

03_PWB_IPT171111

RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Na inslikken

De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Na inademing

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Bij contact met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

ADVIES VOOR DE GENEESHEER

Symptomatische behandeling.

Contacteer het Antigifcentrum (070/245245) voor verdere behandeling in het hospitaal en/of bijkomende inlichtingen.

OPMERKINGEN

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen

GEBRUIKEN

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: Max. 1,5 L/ha/teelt

Alle teelten

Opmerking: Behandeling tussen de rijen zonder het gewas te raken

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing.

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Aardbeiplanten (*Fragaria x ananassa*) (productieveld, selectie – en vermeerderingsveld) (open lucht)

Wortelen (*Daucus carota*) (open lucht)

Pastinaak (*Pastinaca sativa*) (open lucht)

Koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*) (open lucht)

Knoflook (*Allium sativum*) (open lucht)

Uien (drooggeogste) (*Allium cepa*) (open lucht)

Sjalot (*Allium cepa* Aggregatum types) (open lucht)
Broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*) (open lucht)
Sluitkool (kabuskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea* var. *capitata*) (open lucht)
Groengeoogste erwten (zonder peul) (*Pisum sativum*) (open lucht)
Voedererwten (drooggeogst) (*Pisum sativum* subsp. *arvense*) (open lucht)
Aardappelen (*Solanum tuberosum*), aardappelpootgoedteelt (*Solanum tuberosum*) (open lucht)
Zomervlas (zaadproductie) (*Linum usitatissimum*) (open lucht)
Winterkoolzaad / winteraapzaad, zomerkoolzaad / zomerraapzaad (*Brassica napus* subsp. *napus* / *Brassica rapa* subsp. *Oleifera*) (open lucht)
Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))
Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha.1 toepassing
Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)
Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)
Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium* spp.), wilde haver (*Avena fatua*)
Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing
Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst:
Aardbeiplanten (productieveld): 35 dagen
Groengeoogste erwten: 40 dagen
Voedererwten: 45 dagen
Winterkoolzaad / winteraapzaad, zomerkoolzaad./zomerraapzaad: 90 dagen
Zomervlas (zaadproductie): 110 dagen
Wortelen, pastinaak, koolraap, knoflook, uien, sjalot, broccoli, sluitkool, aardappelen, aardappelpoot-
goedteelt: 30 dagen
Waarschuwing:
- De zaden van behandeld vlas niet in diervoeding gebruiken.

Risicobepalende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Suikerbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*), voederbieten (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*) (open lucht)
Opmerking: Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie
In menging met: een toevoegingsstof

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: duist (*Alopecurus myosuroides*)

Dosis: 0,75 - 1 L/ha (mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,2 L/ha op weinig ontwikkelde onkruiden (maximaal 1 - 2 bladeren)

Ter bestrijding van: hanenpoot (*Echinochloa crus-galli*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing (mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,2 L/ha op weinig ontwikkelde onkruiden (maximaal 1 - 2 bladeren)

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing.

Mag gefragmenteerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,4 L/ha op weinig ontwikkelde onkruiden (maximaal 1 - 2 bladeren)

Ter bestrijding van: graanopslag (*volunteers of cereals*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst: 60 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

KLEINE TOEPASSINGEN

Voor deze toepassingen valt het gebruik van het product onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Omdat er slechts beperkte werkzaamheid- en fytotoxiciteitsgegevens werden geëvalueerd, wordt er aangeraden een test uit te voeren voordat het product wordt gebruikt.

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: Max. 1,5 L/ha/teelt

Slasoorten (*Lactuca sp.*), andijvie, radicchio rosso, suikerbrood (*Cichorium endivia/C. intybus var. foliosum*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst: 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Soja (drooggeoogst) (*Glycine max*) (open lucht)

Toepassingsstadium: voor opkomst

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Wortelpeterselie en wortelkervel (consumptie wortels) (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum* & *Chaerophyllum bulbosum*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst: 30 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (groengeoogst, zonder peul) (*Vicia faba*), soja / edamame (groengeoogst, zonder peul) (*Glycine max*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 1,5 L/ha (mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt)

Aantal toepassingen: 1

Opmerking: als gefractioneerde dosis: 2 toepassingen van 0,75 L/ha

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeiing - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst: 40 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Goudsbloem (niet voor consumptie) (*Calendula officinalis*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeling - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeling - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Waarschuwing: Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Zonnebloem (*Helianthus annuus*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Toepassingsstadium: 4 bladeren ontvouwen (tweede bladpaar) - 9 of meer internodia zichtbaar (BBCH 14-39)

Dosis: 0,75 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Zomervlas, winter vlas, winter vlas (zaadproductie) (*Linum usitatissimum*) (open lucht)

Wortelen (zaadproductie) (*Daucus carota*) (open lucht)

Erwten (zaadproductie) (*Pisum sativum*) (open lucht)

Vicia-bonen (zaadproductie) (*Vicia faba*) (open lucht)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae* (annual))

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 0,75 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeling - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Ter bestrijding van: kweekgras (*Agropyron repens*)

Toepassingsstadium: ontwikkelde onkruiden, voor de vorming van de bloeiwijze (BBCH 19-49)

Dosis: 0,75 L/ha, 2 toepassingen of 1,5 L/ha, 1 toepassing

Ter bestrijding van: raaigras (*Lolium spp.*), wilde haver (*Avena fatua*)

Toepassingsstadium: opkomst - 9 bladeren (BBCH 10-19), dosis: 1 L/ha. 1 toepassing

Toepassingsstadium: begin uitstoeling - eerste knoop (BBCH 20-31), dosis: 1,2 L/ha. 1 toepassing

Wachttijd voor de oogst:
Zomervlas, wintervlas:110 dagen

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

Zonnekroon (niet voor consumptie) (*Silphium perfoliatum*) (open lucht)

Toepassingsstadium: 6de knoop van rozet en 6de bladpaar volledig ontwikkeld (BBCH 16)

Ter bestrijding van: eenjarige grasachtige onkruiden (*Poaceae (annual)*)

Dosis: 1 L/ha

Aantal toepassingen: 1

Risicobeperkende maatregelen: Minimale bufferzone van 1 m ten opzichte van oppervlaktewater

LEGE VERPAKKINGEN EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden met water) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het spuittoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de spuittank worden gegoten. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Sputoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.

DISCLAIMER

De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen controle over opslag, vervoer, de wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product.

Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.

PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

En cas d'ingestion

Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

En cas de contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

En cas de contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

INDICATIONS POUR LE MÉDECIN

Traitement symptomatique.

Contacter le Centre Antipoisons (070/245.245) pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier et/ou pour informations complémentaires.

Numéro du Centre Antipoison pour le G.-D. du Luxembourg : (+352) 8002 5500

REMARQUES

Toujours porter un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

USAGES

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Remarque : Max. 1,5 L/ha/culture

Toutes cultures

Remarque : Traitement entre les lignes sans toucher la culture

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Fraisiers (*Fragaria x ananassa*) (champ de production, champ de sélection et de multiplication) (plein air)

Carottes (*Daucus carota*) (plein air)

Panais (*Pastinaca sativa*) (plein air)

Chou-navet, rutabaga (*Brassica napus subsp. rapifera*) (plein air)

Ail (*Allium sativum*) (plein air)

Oignons (récolté sec) (*Allium cepa*) (plein air)

échalote (*Allium cepa* *Aggregatum* types) (plein air)

Chou brocoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*) (plein air)

Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) (*Brassica oleracea* var. *capitata*) (plein air)

Petit pois (sans cosse) (*Pisum sativum*) (plein air)

Pois fourragers (recoltés secs) (*Pisum sativum* subsp. *arvense*) (plein air)

Pommes de terre (*Solanum tuberosum*), culture de plants de pommes de terre (*Solanum tuberosum*) (plein air)

Lin de printemps (production de semences) (*Linum usitatissimum*) (plein air)

Colza d'hiver / navette d'hiver, colza de printemps / navette de printemps (*Brassica napus* subsp. *napus* / *Brassica rapa* subsp. *oleifera*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae* (annual))

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte:

Fraisiers (champ de production): 35 jours

Petit pois (sans cosse): 40 jours

Pois fourragers: 45 jours

Colza d'hiver / navette d'hiver, colza de printemps / navette de printemps: 90 jours

Lin de printemps (production de semences): 110 jours

Carottes, panais, chou-navet, rutabaga, ail, oignons, échalote, chou brocoli, choux pommés, pommes de terre, culture de plants de pommes de terre: 30 jours

Avertissement:

- Ne pas utiliser les graines issues de lin traité pour l'alimentation animale.

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Betteraves sucrières (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *altissima*), betteraves fourragères (*Beta vulgaris* subsp. *vulgaris* var. *crassa*) (plein air) (plein air)

Remarque: Les doses réduites ne peuvent pas être appliquées sur les sols lourds et/ou dans le cas où on soupçonne résistances.

En mélange avec: un adjuvant

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides*)

Dose: 0,75 - 1 L/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Nombre d'applications: 1

Remarque: si doses fractionnées: 2 applications de 0,2 L/ha, sur des adventices peu développées (maximum 1 - 2 feuilles)

Pour lutter contre: panic pied-de-coq (*Echinochloa crus-galli*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Nombre d'applications: 1

Remarque: si doses fractionnées : 2 applications de 0,2 L/ha, sur des adventices peu développées (maximum 1 - 2 feuilles)

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

La dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage

Remarque : si doses fractionnées : 2 applications de 0,4 L/ha, sur des adventices peu développées (maximum 1 - 2 feuilles)

Pour lutter contre: repousses de céréales (*volunteers of cereals*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte: 60 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

UTILISATIONS MINEURES

L'usage du produit pour ces utilisations tombe sous la responsabilité de l'utilisateur. En raison du nombre limité de données évaluées concernant l'efficacité et la phytotoxicité, il est conseillé d'effectuer un test avant l'utilisation du produit.

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente

Méthode d'application: pulvérisation

Remarque : Max. 1,5 L/ha/culture

Laitues (*Lactuca* sp.), endives, radicchio rosso, pain de sucre (*Cichorium endivia*/C. *intybus* var. *foliosum*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae* (annual))

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium* spp.), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte: 30 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Soja (récolté sec) (*Glycine* max) (plein air)

Stade d'application : pré-émergence

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae* (annual))

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Persil à grosses racines et cerfeuil tubéreux (consommation de la racine) (*Petroselinum crispum var. tuberosum* &

***Chaerophyllum bulbosum*) (plein air)**

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte: 30 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (*Vicia faba*), soja / edamame (récolté fraîche, sans cosse) (*Glycine max*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 1,5 L/ha (la dose peut être fractionnée pour autant que la dose totale appliquée ne dépasse pas la dose maximale autorisée pour cet usage)

Nombre d'applications: 1

Remarque: si doses fractionnées : 2 applications de 0,75 L/ha

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte: 40 jours

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Souci (pas pour la consommation) (*Calendula officinalis*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application: début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Avertissement: Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ.

Tournesol (*Helianthus annuus*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: deuxième paire de feuilles étalées (stade 4 feuilles) - 9 ou davantage d'entre-noeuds visibles (BBCH 14-39)

Dose: 0,75 L/ha

Nombre d'applications: 1

Mesures de réduction du risque: Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Lin de printemps, lin d'hiver, lin d'hiver (production de semences) (*Linum usitatissimum*) (plein air)

Carottes (production de semences) (*Daucus carota*) (plein air)

Pois (production de semences) (*Pisum sativum*) (plein air)

Fèves et féveroles (production de semences) (*Vicia faba*) (plein air)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Stade d'application: émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 0,75 L/ha. 1 application

Stade d'application : début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1 L/ha. 1 application

Pour lutter contre: chiendent (*Agropyron repens*)

Stade d'application: adventices développées, avant l'apparition de l'inflorescence (BBCH 19-49)

Dose: 0,75 L/ha, 2 applications ou 1,5 L/ha, 1 application

Pour lutter contre: ray-grass (*Lolium spp.*), folle avoine (*Avena fatua*)

Stade d'application : émergence - 9 feuilles (BBCH 10-19), dose : 1 L/ha. 1 application

Stade d'application : début tallage - premier noeud (BBCH 20-31), dose : 1,2 L/ha. 1 application

Délai avant la récolte:

Lin de printemps, lin d'hiver:110 jours

Mesures de réduction du risque : Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

Silphie (pas pour la consommation) (*Silphium perfoliatum*) (plein air)

Stade d'application : le 6e nœud de la rosette et la 6e paire de feuilles sont complètement développés (BBCH 16)

Pour lutter contre: graminées annuelles (*Poaceae (annual)*)

Dose: 1 L/ha

Nombre d'applications : 1

Mesures de réduction du risque : Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.

DISCLAIMER

Les propriétés et la mode d'application de nos produits mentionnés sur l'étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits et sur notre expérience pratique.

Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l'utilisateur respecte la mode d'emploi repris sur l'étiquette.

Vu qu'il n'y a aucun contrôle lors de l'application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et à d'éventuels dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. En cas de doute concernant l'application du produit, en outre pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

GEFAHRENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein ● **H319:** Verursacht schwere Augenreizung ● **H332:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen ● **H351:** Kann vermutlich Krebs erzeugen ● **H411:** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten ● **P261:** Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden ● **P280:** Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen ● **P301 + P330 + P331 + P310:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen ● **P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen ● **P308 + P311:** BEI Exposition oder falls betroffen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen ● **P391:** Verschüttete Mengen aufnehmen ● **SP1:** Mittel und/ oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen ● **SPa1:** Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 1 ● **SPe3:** Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten. (Siehe Risikominderungsmaßnahmen) ● **SPo:** Das behandelte Gewächs/die behandelten Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen ● **EUH208:** Enthält Propaquizafop. Kann allergische Reaktionen hervorrufen ● **EUH401:** Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



AGIL®

© ADAMA Agan Ltd.



HERBICIDE/HERBICIDE

Emulgeerbaar concentraat/
concentré émulsionnable (EC)



Werkzame stof/Substance active

- Propaquizafop/Propaquizafop 100 g/L (9,6% w/w)



Informatie / Information

Toelatingsnummer/No. d'autorisation: 8514P/B

No. d'agrégation Lux: L02190-073

Toelatingshouder / Détenteur de l'autorisation:

ADAMA Registrations B.V.,

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden,

Nederland/Pays-Bas

Tel. +31 33 205 68 00

www.adama.com

Batch nr. & productiedatum: zie verpakking/

No. du Lot & date de production: voir l'emballage



BELGIË/BELGIQUE



LUXEMBOURG/
LUXEMBOURG

UN3082



8 718077 001340



www.agrirecover.eu

GROEP
GROUPE

1

HERBICIDE
HERBICIDE

Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.

GEVARENAANDUIDINGEN

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt • H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie • H332: Schadelijk bij inademing • H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker • H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden • P261: Inademing van damp en spuitnevel vermijden • P280: Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming • P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bijeen spoelen • P308 + P313: NA (mogelijke) blootstelling: Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen • P391: Gelekte/gemorste stof opruimen • SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt • SPa1: Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 1 • SPa3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen) • SPa: Na de behandeling de gerelaten oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitveloetof is opgedroogd

AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE

EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebasten huid veroorzaken • EUH208: Bevat propaquizafop. Kan een allergische reactie veroorzaken • EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

HANTEREN EN OPSLAG

Een goede ventilatie van de werkplaats vereist. Damp niet inademen. In goed gesloten originele verpakking bewaren. Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. De verpakking mag niet worden hergebruikt.

Pour l'emploi: voir la notice.

MENTIONS DE DANGER

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires • H319: Provoque une sévère irritation des yeux • H332: Nocif par inhalation • H351: Susceptible de provoquer le cancer • H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

CONSEILS DE PRUDENCE

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette • P261: Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation • P280: Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux • P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche, NE PAS faire vomir et appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • P308 + P313: EN CAS D'EXPOSITION prouvée ou suspectée: Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin • P391: Recueillir le produit répandu • SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage • SPa1: Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 1 • SPa3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque) • SPa: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau • EUH208: Contient du propaquizafop. Peut produire une réaction allergique • EUH401: Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Une bonne ventilation du lieu de travail est nécessaire. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé. L'emballage ne doit pas être réutilisé.

GEFAHRENHINWEISE

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein • H319: Verursacht schwere Augenreizung • H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen • H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen • H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

SICHERHEITSHINWEISE

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten • P261: Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden • P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen • P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLÜCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen • P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen • P391: Verschüttete Mengen aufnehmen • SP1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen • SPa1: Um die Bildung von Resistenzen zu verhindern, sollten Sie dieses Produkt durch Produkte mit einer anderen Wirkungsweise abwechseln. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts lautet 1 • SPa3: Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässern einhalten. (Siehe Risikominierungsmaßnahmen) • SPa: Das behandelte Gewächs/ die behandelte Fläche nur wiederbetreten nach Abtrocknung des Spritzbelages

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen • EUH208: Enthält Propaquizafop, Kann allergische Reaktionen hervorrufen • EUH401: Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten



ADAMA


L117910CFR_03



GEVAAR
DANGER
GEFAHR



12 x 1 L



AGIL®



ADAMA



BELGIË/
BELGIQUE



LUXEMBURG/
LUXEMBOURG



GEVAAR/DANGER/GEFAHR



UN3082

L11791PAAR_03

48 x 12 L