

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

**МЕРПАН 80 ВГ**

**Притежател на разрешението:** АДАМА Агрикалчър Б.В., Арnhemсеевг 87, 3832 GK  
Лойсден, Нидерландия

**Функция:** фунгицид с контактно действие

**Активно вещество:** 800 г/кг каптан

**Вид на формулацията:** вододиспергируеми гранули (ВГ)

**Категория на употреба:** втора професионална

**Номер на разрешението за пускане на пазара и употреба №:** 01848-ПРЗ/1-15.06.2020 г.

**Продуктът да се прилага при спазване на Закона за пчеларството.**



**Внимание**

**Предупреждения за опасност:**

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H351 Предполага се, че причинява рак.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

**Препоръки за безопасност:**

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

**Допълнително етикетирание:**

SP1 Да не се замърсяват водите с продукта или неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe2 Да не се прилага при пясъчливи почви със съдържание на пясък над 80% с цел опазване на подпочвените води.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 м с включена 10 м растителнозащитна ивица при ябълки, круши, дюли, праскови, нектарини, сливи и череши и 30 м с включена 20 м растителнозащитна ивица при кайсии до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

Ограничете достъпа на домашни любимци до третираните площи до 48 часа след третирането.

**Разрешени употреби:**

Култури	Патогени	Доза на приложение (мл/дка)	Количество вода (л/дка)	Максимален брой приложения	Интервал между третиранята (дни)	Момент на приложение	Карантинен срок (дни)	Забележка
---------	----------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------

Ябълки, круши, круши Наши, дюли	Струпясване ( <i>Venturia spp.</i> ), гниене при съхранение ( <i>Gloeosporium sp.</i> ), стемфилиум по круши ( <i>Stemphylium vesicarium</i> )	200	80-150	6	7-10	ВВСН 9-85 (зелените връхчета са 5 мм над люспите на пъпките – напреднало узряване: увеличаване интензивността на оцветяването, характерно за сорта)	28	При спазване на закона за пчеларството
Праскови, нектарини	Къдравост по праскови ( <i>Taphrina deformans</i> )	450	80-120	1	10	ВВСН 93-97 (започва листопадът – всички листа са паднали)	21	4 третириания за култура/вегетация с минимален интервал от 10 дни – максимум 10.2 кг а.в./ха за вегетация. Да се спазва минимален интервал от 10 дни между отделните приложения.
	Къдравост по праскови ( <i>Taphrina deformans</i> ), гъбна сачмянка ( <i>Coryneum beijerinckii</i> ), фомопсис ( <i>Phomopsis amygdali</i> )	375		1		ВВСН 51 (цветните пъпки са затворени, виждат се светло кафяви люспи)		
	Къдравост по праскови ( <i>Taphrina deformans</i> ), гъбна сачмянка ( <i>Coryneum beijerinckii</i> ), фомопсис ( <i>Phomopsis amygdali</i> )	225		1		ВВСН 59 (повечето цветове с венчелистчетата са оформени като топчици (бял бутон))		
	Ранно и късно кафяво гниене ( <i>Monilia spp.</i> )	225		1		ВВСН 69-73 (край на цъфтеж (паднали са всички венчелистчета) – вторично окапване на завръза)		
Кайсии, сливи	Сачмянков синдром ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> ) и ранно и късно кафяво гниене ( <i>Monilia spp.</i> )	225	80-150	4	10	ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след цъфтежа – оцветяването се развива)	21	
Череша	Сачмянков синдром ( <i>Wilsonomyces carpophilus</i> )	225	80-150	2	10	ВВСН 71-85 (разрастване на яйчника: окапване на завръзи след	21	

	и ранно и късно кафяво гниене ( <i>Monilia</i> spp.)					цъфтежа – оцветяването се развива)		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

**Техника на приложение при всички употреби:** механизизирана наземна техника за цялостно листно пръскане.

**Съвместимост:**

Продуктът не е съвместим с продукти за растителна защита с алкална реакция (бордозелов разтвор, полисулфиди и др.) и продукти на основата на масла и сулфиди.

В случай на използване в резервоарна смес с други продукти, да се има предвид най-дългия карантинен срок и предпазните мерки предвидени за най-токсичния продукт. В случай на отравяне, лекарят да се информира за продуктите, включени в сместа.

**Фитотоксичност:** Не се препоръчва употребата на продукта върху някои сортове ябълки (Stark Delicios, Stayman, Renetta del Canada, Winesap) и круши (Stark Delicios, Stayman, Renetta del Canada, Winesap). Препоръчително е да се прилага най-малко 3 седмици след третиране с минерални масла и поне 7 дни след третиране със сяра.

**Мерки за първа помощ:**

**При вдишване:** Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е неравномерно или е спряло, приложете изкуствено дишане. Обадете се на лекар.

**При контакт с кожата:** Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато отстранявате всички замърсени дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо.

**При контакт с очите:** Незабавно промийте обилно с вода. След първоначалното промиване отстранете контактните лещи и продължете да промивате поне 15 минути. Дръжте очите си отворени по време на изплакването. При продължаващи симптоми се обадете на лекар.

**При поглъщане** Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.

**Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение:** Симптоматично лечение.

**При спешни случаи на остро отравяне:** УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” – “Клиника по токсикология”, тел. 02/9154409, e-mail: [poison\\_centre@mail.orbitel.bg](mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg), [www.pirogov.eu](http://www.pirogov.eu)

**Единен европейски номер за спешни повиквания:** 112

**Работа с продукта:**

По време на смесване/зареждане на продукта носете защитни ръкавици и предпазни очила/маска и защитен гащеризон при прилагане. Носете защитни ръкавици, при повторно влизане в третираната зона.

Да се избягва контакт с кожата, очите или облеклото. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши, когато се използва този продукт. Не вдишвайте прах / пушек / газ / мъгла / пари / спрей. Да се борави с продукта на места с всмукателна вентилация.

Не влизайте повторно в третираната площ преди да са минали 48 часа от третирането.

**Обезвреждане на отпадъците:**

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

**Условия на съхранение:**

Опаковката да се съхранява плътно затворена, правилно етикетирани, на сухо и добре проветриво място. Да се държи извън обсега на деца.

**Транспорт:** Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

**ВНИМАНИЕ:** да се използва само за целите и при условията, посочени в този етикет. Ползвателят на продукта е отговорен за всички щети, причинени от неправилната му

употреба. Спазването на цялата информация, съдържаща се в този етикет е от съществено значение за да се гарантира ефективността на третирането и да се избегне увреждане на растения, хора и животни.

ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА.

ДА СЕ ПРИЛАГА КОГАТО НЯМА ВЯТЪР.

ДА НЕ СЕ ПРОДАВА НАСИПНО.

**Дата на производство:** виж опаковката

**Партиден номер:** виж опаковката

**Срок на годност:** 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ.

