

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

ADAMA
ESSENTIALS



Leopard 10 EC

HERBICIDA-QUINOXALINA
QUIZALOFOP-P-ETHYL

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 0.955 g/ml a 20°C
SOLVENTE: Xileno

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El LEOPARD 10 EC es un herbicida sistémico el cual es absorbido rápidamente por las hojas y translocado por el floema y xilema, inhibe la biosíntesis de lípidos. El sitio de acción es la enzima acetil CoA carboxilasa. Se acumula en los tejidos meristemáticos, causando la destrucción de los mismos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. El producto no tiene efecto sobre las partes del equipo. Utilice botas, mascarilla, anteojos, guantes. Utilice hasta 400 litros de agua por hectárea. Utilice boquillas de abanico plano.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. En aplicación terrestre, aplique un volumen total de 80-400 litros de agua por hectárea, a una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. Utilice un surfactante para mejorar su efectividad.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMA, REPÚBLICA DOMINICANA :

CULTIVO	DOSIS
Soya Glycine max	1.25-1.5 l/ha (0.875-1.05 l/mz)
Piña Ananas comusus	1.1-2.2 l/ha (0.77-1.54 l/mz)

MALEZAS QUE CONTROLA:

Pasto bermuda, Cynodon dactilon, Salea Digitaria sanguinalis, Arrocillo Echinochloa colonum, Zacate amargo Eleusine indica, Avena loca Avena fatua, Caminadora Rottboelia exaltata, Pasta paja Leptochloa filiformis, Pasto Johnson Sorghum halepense.

EPOCA DE APLICACIÓN: Se aplica sobre el follaje de las malezas y cuando estas tengan 2-5 hojas verdaderas, hasta que haya retoñado por completo para las gramíneas anuales y para las perennes cuando tengan de 4-6 hojas verdaderas pero antes de la nodulación, osea, en postemergencia a las malezas y cuando los estolones tengan de 10-15 cm de largo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una aplicación al inicio del cultivo, cuando las malezas tengan de 2 a 5 hojas verdaderas y estén en activo crecimiento.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 24 horas.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas o esperar a que se seque el rocío de aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las plantas, si se siguen las recomendaciones dadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con productos alcalinos como el Caldo Bordelés, Sulfato de lima o cal. Antes de mezclar con otros plaguicidas, realice una prueba a pequeña escala y observe las reacciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene lejos de niños y casas de habitación. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es inflamable, no es corrosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, calambres, irritación de los ojos y la piel, por ingestión produce problemas gastrointestinales.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lave la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios, realice la respiración artificial. Acuda a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave abundantemente con agua, manteniendo los párpados bien abiertos por lo menos 15 minutos. Acuda a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Hospital San Rafael, Santa Tecla
Hospital Escuela
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis E. Aybar
Hospital Dr. Francisco Moscoso

PAIS

Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Panamá
República Dominicana
República Dominicana

TELÉFONO

2251-3560 / 2232-0735
2525-5800 ext. 148
232-2322 / 232-2316
2223-1028
269-2741
684-3478
681-6922/2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente, no se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en el panfleto.

FORMULADO POR:

ADAMA AGAN,LTD

P. O. BOX 262, ASHDOD (77102), ISRAEL

TELÉFONO: 972 (8) 8515211

FAX: 972 (8) 8522806

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	898-37	17-12-08
EI SALVADOR	4371	29-11-00
HONDURAS	365, F183, TI	08-04-99
COSTA RICA	4371	09-07-99
PANAMÁ	1211	04-09-09
REP. DOMINICANA	3003	10-01-01