

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ADAMA
ESSENTIALS



Mirador 25 SC

FUNGICIDA- ESTROBILURINA
AZOXISTROBIN

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.


MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: MIRADOR 25 SC es un fungicida con propiedades protectantes, curativas, erradicantes, translaminares y sistémicas. Inhibe la germinación de esporas y el crecimiento micelial y también muestra actividad antiesporulante. Puede ser usado en una amplia gama de cultivos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede aplicarse con equipo terrestre o aéreo. Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Si aplica por vía terrestre, utilice hasta 400 litros de caldo. En aplicaciones aéreas en banano y plátano utilice volúmenes de agua de 15 a 30 litros por hectárea. Utilice boquillas de abanico plano. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto, agite y termine de llenar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA Y HONDURAS

CULTIVO	ENFERMEDADES QUE CONTROLA	DOSIS
Banano y plátano <i>Musa</i> spp.	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> Mohos y pudrición de la corona <i>Colletotrichum musae</i> , <i>Fusarium pallidoroseum</i> , <i>F. moniliforme</i> , <i>F. pusillum</i> , <i>F. semiseptum</i> , <i>Verticillium</i> spp., <i>Verticillium</i> <i>theobromae</i> , <i>Botryodiplodia theobromae</i> , <i>Ceratocystis paradoxa</i>	0.4 l/ha 300 - 400 ppm
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano <i>Alternaria</i> sp. Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	0.30 - 0.75 l/ha
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha de la hoja <i>Rhizoctonia solani</i> Tizón de la hoja <i>Pyricularia oryzae</i>	0.60 - 0.70 l/ha
Helecho hoja de cuero <i>Rumohra adiantiformis</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum acutatum</i>	0.40 - 0.60 l/ha
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mildiu polvoroso <i>Erysiphe</i> sp. <i>Fusarium</i> <i>Fusarium</i> spp. <i>Alternaria</i> <i>Alternaria</i> spp. Gomosis <i>Didymella bryoniae</i>	0.60 - 0.80 l/ha
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Semilleros	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> <i>Cercospora</i> <i>Cercospora nicotinae</i> <i>Alternaria</i> <i>Alternaria tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora nicotinae</i> var. <i>parasitica</i>	0.4 l/ha
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya <i>Hemileia vastatrix</i> Antracnosis <i>Colletotrichum coffeanum</i> Ojo de gallo <i>Mycena citricolor</i> <i>Cercospora</i> <i>Cercospora coffeicola</i>	0.25 - 0.50 l/ha
Cebolla <i>Allium cepa</i> Ajo <i>Allium sativum</i>	Mildiu <i>Peronospora destructor</i> <i>Alternaria</i> <i>Alternaria</i> spp.	0.30-0.40 l/ha
Rosas <i>Rosa</i> sp.	Mildiu polvoroso <i>Sphaerotheca pannosa</i> Mildiu veloso <i>Peronospora</i> spp. Antracnosis <i>Colletotrichum</i> sp. Rizoctonia <i>Rizoctonia</i> sp. Sclerotinia <i>Sclerotinia</i> sp.	0.40-0.50 l/ha
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya <i>Uromyces phaseoli</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Mancha foliar <i>Cercospora</i> spp.	0.24-0.32 l/ha
Arveja China <i>Pisum sativum</i>	Tizón de la hoja <i>Ascochyta</i> sp.	0.50 l/ha
Ejote Frances <i>Phaseolus</i> sp.	Roya <i>Uromyces phaseoli</i>	0.40-0.60 l/ha
Maíz dulce <i>Zea mays</i>	Roya <i>Puccinia sorghi</i>	0.40-0.60 l/ha
Zanahoria <i>Daucus carota</i>	<i>Alternaria</i> <i>Alternaria dauci</i>	0.40-0.60 l/ha
Apio <i>Apium graveolens</i>	<i>Septoria</i> <i>Septoria apii</i>	0.40-0.60 l/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: Realizar aplicaciones espaciadas a intervalos de 8 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Para banano, plátano, arroz, café, helechos: 0 días. Para tomate y papa 7 días. Melón, sandía, pepino y hortalizas: 7-10 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado. En banano y plátano 0 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presenta irritación de la piel y los ojos. Es nocivo si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lave la boca con abundante agua. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Consulte a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consultar a un médico.

INHALACION: Lleve a la víctima al aire libre. Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si la respiración es dificultosa, darle oxígeno. Si no hay respiración, administrar respiración artificial. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave la parte afectada con mucho agua durante 10-15 minutos. Si el dolor persiste, consulte a un oftalmólogo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TELÉFONO: (972) 8-629-6619
FAX: (972) 8- 629-6019

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
GUATEMALA	898-67	17-08-2012
BELICE	0268-3	29-05-09
HONDURAS	433, F261, TII	07-02-12
NICARAGUA	MC-274E-2-2009	20-11-09
PANAMÁ	5168	17-12-09
REP. DOMINICANA	3187	16-03-09