

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Acaristop 50 SC

ACARICIDA-TETRAZINA
CLOFENTEZINA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.19 g/ml a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: **Acaristop 50 SC** es un acaricida a base de clofentezina con acción de contacto, actúa sobre huevos y larvas recién nacidas, evitando desde el inicio daños a su cultivo con las consecuencias negativas. **Acaristop 50 SC** interrumpe eficazmente el ciclo biológico de las arañas (ácaros). El efecto residual de **Acaristop 50 SC** es prolongado.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Para la aplicación de **Acaristop 50 SC** se recomienda el uso de equipos de aplicación terrestre, utilizando de 100 a 400 litros de agua por hectárea, utilice boquillas de abanico plano. Todo equipo de aplicación tiene que estar debidamente calibrado antes de usarse, con respecto a la velocidad, dosis y uniformidad de distribución. El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Cerciórese que el equipo de aplicación esté limpio y no contaminado, calcule cuidadosamente la cantidad de mezcla de aplicación, a fin de prevenir cualquier residuo en el tanque después de hacer los tratamientos. Llene a ¼ - ½ tanque de mezcla con agua limpia, empiece a agitar, añada la cantidad medida y calculada de producto y continúe agitando durante el mezclado y aplicación para mantener una solución de rocío uniforme. Lave el equipo inmediatamente después de usarlo. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas y guantes de hule, mascarilla, anteojos, dosificadores graduados y equipo de aplicación en buen estado.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, BELICE, HONDURAS Y COSTA RICA.

CULTIVO	ÁCAROS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Cítricos <i>Citrus</i> spp	Arañitas rojas <i>Tetranychus urticae</i>	20-40 ml/100 litros de agua
Flores en general	Arañita bimaculada <i>Tetranychus neocaledonicus</i>	20-40 ml/100 litros de agua

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando se observen las primeras arañas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Cada 7-15 días según la presencia de la plaga.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 7 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado o 24 horas. O utilice el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: **Acaristop 50 SC** es compatible con varios fungicidas, insecticidas o acaricidas. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer este tipo de mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes. Transpórtese y almacénesse bajo llave en un lugar fresco, seco, bien ventilado y alejado del calor o fuego directo y de la luz. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de fertilizantes y herbicidas. No es corrosivo, explosivo, ni inflamable

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: No es peligroso. Ligeramente irritante para la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lave la boca con agua. No induzca al vómito. No le dé de beber nada al paciente. Mantenga a la víctima en reposo. Consulte a un médico.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con mucha agua. Consulte a un oftalmólogo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	251-3560
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	Belice	231-1548
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

SAFAPAC, LTD
4 STAPLEDON ROAD, ORTON
SOUTHGATE, PETERBOROUGH PE2 6BT
INGLATERRA, TEL:+44(0)1733367650
FAX:+44(0) 17333367651
www.safapac.co.uk

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
GUATEMALA	898-1	30-10-12
BELICE	0306-1	03-03-10
HONDURAS	370, F186, TIII	13-08-01
COSTA RICA	2784	17-12-94