

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Seizer 10 EC

INSECTICIDA-PIRETOIDE
BIFENTHRIN



DAÑINO
ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Solvesso 150
DENSIDAD: 0.915-0.925 g/ml

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: Seizer 10 EC es un insecticida acaricida que controla insectos por contacto y por actividad del veneno en el estómago. Actúa paralizando los sistemas nerviosos de los insectos. Seizer 10 EC no es absorbido por el follaje de la planta. Se aplica directamente al cultivo, ya sea en forma manual o con equipo mecanizado, para esta práctica puede usar una bomba de espalda, su uso es al suelo antes de la siembra, o directamente sobre el cultivo.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilice el equipo convencional para aplicar líquidos, si lo hace con equipo mecanizado a aplicaciones aéreas antes de aplicar, asegúrese que el equipo esté en buenas condiciones de uso y bien calibrado. Este producto no es corrosivo, no daña el equipo de aplicación, lávelo con agua después de usarlo. Aplicarlo con boquilla de cono hueco.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de mezcla, agregue Seizer 10 EC, agite y termine de llenar con agua. Agite antes de aplicarse, haga una premezcla para determinar incompatibilidades.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: USO AUTORIZADO EN: HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA.



CULTIVO	PLAGAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Gallina ciega <u>Phyllophaga</u> sp Gusano Alambre <u>Aeolus</u> , <u>Melanotus</u> Afidos <u>Aphis</u> sp Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Lorito verde <u>Empoasca fabae</u> Falso medidor <u>Trichoplusia ni</u>	0,5-0,6 ml/l de agua
Papa <u>Solanum tuberosum</u> Arveja <u>Pisum sativum</u> Repollo <u>Brassica oleracea</u>	Coralillo <u>Elasmopalpus linosellus</u> Palomilla <u>Phthorimaea operculella</u> Afidos <u>Aphis</u> sp Minador de la hoja <u>Lyriomiza</u> sp Pulga Saltona <u>Epitrix</u> sp, <u>Agriotes</u> sp	0,5-0,75 ml/l de agua 0,25-0,85 ml/l de agua
Chile <u>Capsicum annum</u>	Gusano alambre <u>Acolus</u> , <u>Melanotus</u> Gallina ciega o joboto <u>Phyllophaga</u> sp	0,5-0,75 ml/l de agua
Tomate <u>Solanum lycopersicum</u>	Gallina ciega o joboto <u>Phyllophaga</u> sp Gusano trozador <u>Agrotis</u> sp Afidos <u>Mysus persicae</u> , <u>Aphis</u> sp Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Trips <u>Thrips tabaci</u>	0,5-0,75 ml/l de agua
Melón <u>Cucumis melo</u>	Araña roja <u>Tetranychus</u> spp Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Afidos <u>Aphis</u> sp	0,35-0,45 l/ha
Ornamentales	Araña roja <u>Tetranychus</u> spp Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Afidos <u>Aphis</u> sp	0,35-0,45 l/ha

ÉPOCA E INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar cuando los índices de la población de la plaga así lo requiera.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: En papa, chile, tomate, algodón, arveja, repollo y ornamentales: 7 días, y en melón: 3 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que allá secado el rocío (4 horas)

FITOTOXICIDAD: Seizer 10 EC no es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Seizer 10 EC no presenta incompatibilidad al mezclarlo con otros plaguicidas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar este producto en el envase original, bien cerrado y claramente etiquetado. El área de almacenaje debe ser fresca, seca y debe evitar el exceso de calor. Durante el almacenaje evite la contaminación con otros plaguicidas, fertilizantes y los concentrados alimenticios para consumo animal deben almacenarse separado de los agroquímicos. No almacenar en casas de habitación. Este producto no es corrosivo. No es combustible.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas pueden ser reacciones alérgicas, estornudadera, obstrucción nasal y dermatitis. En otros casos, éstos incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómito.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lávese la boca con abundante agua. Acuda a un médico inmediatamente. En caso de ingestión, hacer un lavado de estómago y administrar carbono activado.

INHALACIÓN: Lleve al paciente al aire libre. Mantenga a la persona afectada abrigada, y en reposo. Si no hay respiración, realice la respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno. Llame a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Consulte inmediatamente con un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa y zapatos contaminados y lave las partes afectadas con agua y jabón suave; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:
INSTITUCIÓN**

Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr. Moscoso Puello

PAÍS	TELÉFONO
Honduras	2232-2322 / 2232-2316
Nicaragua	2289-4514
Panamá	523-4948
República Dominicana	6843672
República Dominicana	6816922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos veces más; después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.

FORMULADO POR:

**ADAMA MAKHTESHIM, Ltd.
P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TELÉFONO: (972) 8-629-6619
FAX: (972) 8- 629-6019**

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
HONDURAS	936, F286, TIII	14-12-12
NICARAGUA	MC-096C-1-2007	14-05-07
PANAMÁ	5000	21-05-07
REP. DOMINICANA	3177	13-03-09