

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

ADAMA



Rimon Fast 10 SC

INSECTICIDA- PIRETROIDE, BENZOILUREA
BIFENTRINA, NOVALURON



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.08 mg/l a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN



**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: RIMON FAST 10 SC Actúa por ingestión y por contacto. Este insecticida combina dos ingredientes activos: el Novaluron que actúa por ingestión y por contacto con prolongada acción residual, recomendado para el control de larvas fitófagas y de insectos masticadores, el mecanismo específico consiste en la inhibición de la biosíntesis de la quitina afectando el proceso de muda y la Bifentrina que actúa por contacto e ingestión interfiriendo en la membrana nerviosa, con cambios conformacionales de las proteínas en la interfase lipido-proteína, provocando un retardo en el cierre de los canales de sodio después de que el impulso ha pasado. El mecanismo de acción está asociado con el canal de sodio de la membrana nerviosa. Se fija sobre el canal de sodio cuando la puerta está en posición abierta, pero no la mantiene abierta definitivamente, provocan una cinética lenta sobre el cierre del canal de sodio, por lo tanto induce una prolongación de la apertura del canal, lo que corresponde a una prórroga de la fase de despolarización del potencial de acción.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilice el equipo convencional para aplicar líquidos, si lo hace con equipo mecanizado o aplicaciones aéreas antes de aplicar, asegúrese que el equipo esté en buenas condiciones de uso y bien calibrado. Este producto no es corrosivo, no daña el equipo de aplicación; lávelo con agua después de usarlo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar la mezcla de aspersión, vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **RIMON FAST 10 SC**, en la mitad del volumen de agua total a emplear. Adicione a esta mezcla la cantidad de agua requerida para completar la mezcla de aspersión, agitando bien y de manera constante. Las mezclas del producto preparadas para la (s) aplicación (es), deben utilizarse inmediatamente y nunca guardarse para aplicaciones en días posteriores. Los equipos de aspersión deben tener un sistema adecuado de agitación, para poder garantizar una mezcla homogénea durante el transcurso de la aplicación. De lo contrario, se debe agitar constantemente, asegurando la homogeneidad de la mezcla durante la aplicación y en cada una de las cargas del equipo de aspersión.



USO AUTORIZADO EN: NICARAGUA, PANAMÁ, EL SALVADOR, REPÚBLICA DOMINICANA, HONDURAS.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	INSECTOS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Maíz <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4-0.5 l/ha

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar Rimon Fast 10 SC cuando la presencia de *Spodoptera Frugiperda* se evidencie en un 20 o 30 % de daño fresco. Aplicar cuando las larvas estén en sus primeros estadios (L1 y L2). Con respecto al cultivo cuando éste tenga de 5-10 días de emergencia para el maíz

INTERVALO DE APLICACIÓN: Hacer dos aplicaciones consecutivas a intervalos de 8 días; no hacer más de cuatro aplicaciones por ciclo de cultivo para evitar riesgo de generar resistencia.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: siete días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 12 horas, utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fertilizantes foliares, fungicidas o insecticidas usuales, en caso de duda se recomienda hacer una prueba para determinar compatibilidad. NO se debe dejar mezclas preparadas de un día para otro.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de herbicidas. No es corrosivo.



**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nocivo por ingestión, no se conocen síntomas específicos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca el vomito. Lave la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.

INHALACION: Lleve a la víctima al aire libre. Mantener al afectado abrigado y en reposo. En caso de problemas respiratorios, realice la respiración artificial. Acuda a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua, manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón. Luego lave con agua caliente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital San Rafael, Santa Tecla
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr. Moscoso Puello

PAÍS

Guatemala 2251-3560 / 2232-0735
Belice 231-1548
El Salvador 2525-5800 ext. 148 y 149
Honduras 232-2322 / 232-2316
Nicaragua 2289-4514
Costa Rica 2223-1028
Panamá 523-4948
República Dominicana 6843672
República Dominicana 6816922

TELÉFONO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. No utilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos veces más; después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA: se garantiza el producto si se siguen las instrucciones del panfleto. El uso de este producto de acuerdo a los períodos de carencia y límites de tolerancia en los cultivos de exportación recomendados en este panfleto y con apego a las normas legales del país productor y del país importador, es responsabilidad exclusiva del usuario. En caso de duda, consulte las publicaciones respectivas o al técnico en la materia.

FORMULADO POR:

ADAMA MAKHTESHIM, LTD.

P.O.B. 60, Industrial Zone
Beer-Sheva 84100, Israel
TEL: (972)-8-6296996 – FAX: (972)-8-6296909

ADAMA ANDINA B.V. SURCURSAL COLOMBIA
Calle 1C 7-53 Interior zona franca Barranquilla, Colombia
TEL: (571)-6446730 – FAX: (571) 6401210

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO REGISTRO	FECHA REGISTRO
GUATEMALA	898-92	05-03-15
HONDURAS	992, F342, TIII	30-07-13
PANAMÁ	5745	08-05-12
REP.DOMINICANA	3959	18-04-12