



ADAMA

PORTAFOLIO FRUTALES

Avanzamos juntos para
producir más y mejor



Cultivo sano = Óptimos rendimientos

FUNGICIDAS	INGREDIENTE ACTIVO	CARACTERÍSTICAS	DOSIS / ESTAÑÓN (200 L AGUA)	USOS Y OTROS
Mastercop 6.6 SL Mastercop 21.36 SC	Complejo cúprico	Fungicida-bactericida Acción de contacto y curativo	250 cc	Anillado, crespada, roña, antracnosis. Certificado orgánico ÖKO 
Oxicob Mix Azul 53 WP	Oxicloruro de cobre + Mancozeb	Acción de contacto Efecto preventivo	500 g	Manchas de hoja y fruto. Evitar aplicarlo durante la floración.
Hidrocob 50 WP	Cobre metálico	Fungicida inorgánico Acción de contacto	500 g	Manchas de hoja y fruto. Evitar aplicarlo durante la floración.
Mirage 45 EC	Procloraz	Fungicida de contacto Acción protectante	200 cc	Roña, antracnosis y otras manchas. Puede aplicarse post cosecha.
Molto 49 EC	Procloraz + Propiconazole	Fungicida sistémico y de contacto. Acción preventiva, protectora, curativa y erradicante	250-350 cc	Antracnosis, alternaria, roña.
Supreme 40 EW	Procloraz + Tebuconazol	absorción . Acción protectante, curativa y erradicante	250-350 cc	Roña, antracnosis y otras manchas. Evitar aplicarlo durante la floración.
Orius 25 EW	Tebuconazol	Fungicida triazol sistémico de amplio espectro. Acción protectora, curativa y erradicante.	200 cc	Roña, antracnosis y otras manchas. Evitar aplicarlo durante la floración.
Mirador 25 EC	Azoxystrobin	Fungicida con propiedades protectantes, curativas, erradicantes. Con actividad antiesporulante.	200-250 cc	Antracnosis, manchas (Cercopora).
Cuprimicin 61.7 WP Cuprimicin 20 SP	Streptomycin + Oxitetraciclina + Cobre	Fungicida-bactericida. Estreptomycin y la oxitetraciclina son bactericidas de origen biológico.	400-600 g 200 g	Anillado, crespada, roña, antracnosis. Evitar aplicarlo durante la floración.
Odeon 72 SC	Clorothalonil	Fungicida de contacto . Amplio espectro.	0.5 L	Preventivo contra varios hongos.

ATENCIÓN: La información contenida en el cuadro es una sugerencia de uso, el momento de aplicación y productos puede ajustarse a las condiciones agroclimáticas propias de cada región y país.

Aprenda más en



Mantega a Raya los Insectos



INSECTICIDAS	INGREDIENTE ACTIVO	CARACTERÍSTICAS	DOSIS / ESTACIÓN (200 L AGUA)	USOS Y OTROS
Bralic 12.5 EC 	Extracto de ajo	Repelente natural Altera los hábitos alimenticios. Acción disuasiva . Potencializador de otros insecticidas.	250 cc acompañado con otros productos 1 L Solo	Trips, chupadores y otros . Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo. Certificado orgánico BCS ÖKO
Acaristop 50 SC	Coflentazina	Acaricida de contacto	100 cc	Control de huevos de araña. Aplicar cuando hay altas poblaciones
Instar 1.8 EC	Abamectina	Insecticida - Acaricida de acción translaminar. Actúa tanto por ingestión como por contacto.	100-200 cc	Ácaros, minador, trips. La abamectina de mejor calidad que puede aplicar
Mavrik 24 EW	Tau-fluvalinato	Insecticida - Acaricida Acción de contacto y estomacal. Afecta la respiración de la plaga. Amigable con polinizadores	250 - 350 cc	Mosca blanca, ácaros, escama, chinche, lepidópteros
Galil Ultra 39.6 SC	Bifentrina + Imidacloprid + Abamectina	Actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. No aplicar en floración	250 - 350 cc	Ácaros, picudo, mosca blanca, trips, áfidos
Kohinor 35 SC	Imidacloprid	Sistémico con actividad translaminar. Actúa por ingestión y por contacto.	200 cc	Mosca blanca, áfidos, picudos y trips. Evitar aplicarlo durante la floración.
Rimon 10 EC	Novaluron	Inhibe la formación de quitina. Larvicida por ingestión.	100 cc	Trips, scirtothrips, mosca blanca. No es tóxico para las abejas
Kadabra 48 SC	Bifentrina + Fipronil	Acción sistémica, por ingestión y por contacto. Efecto Knockdown. No aplicar en floración.	200 - 300 cc	Actúa sobre insectos perforadores, chupadores y masticadores
Pyrinex 48 EC	Clorpirifos	Acción de contacto, estomacal y respiratorio	250 cc al tronco 1L al suelo	Trips, scirtothrips, joboto , cortador. Evitar aplicarlo durante la floración
Diazol 60 EC	Diazinon	Acción de contacto, estomacal y respiratoria	250 cc al tronco 500 cc al suelo	Joboto , cortador, trips. Evitar aplicarlo durante la floración

Manejo de Arvenses

HERBICIDAS	INGREDIENTE ACTIVO	CARACTERÍSTICAS	DOSIS / ESTACIÓN (200 L AGUA)	USOS Y OTROS
Galigan 24 EC	Oxiflourfen	Pre y post emergente Amplio espectro de control sobre hojas anchas y gramíneas	1 L como sello 250 cc como activador de otros herbicidas	Aplicación al suelo
Burner 15 SL	Glufosinato de Amonio	Post-emergente sistémico no selectivo, con cierta acción de contacto	1.5 – 2 L	Aplicar en banda dirigido a las malezas en pleno crecimiento Usar pantalla

Potencializadores del Cultivo

POTENCIALIZADORES DEL CULTIVO	INGREDIENTE ACTIVO	CARACTERÍSTICAS	DOSIS POR APLICACIÓN	USOS Y OTROS
ExpertGrow	Extracto de alga (Ascophyllum nodosum) + Ácido fúlvico + Glicina betaina + Ácido salicílico + Potasio soluble	Bioestimulante. Mejora la capacidad de la planta para superar el estrés abiótico. Exclusiva tecnología Bioprocess	1-1.5 L/ha	Floración más uniforme Mayor cuaje de frutos Mejor llenado frutos Incremento del rendimiento
Agrosol 77,8 SL	Hormonas vegetales y vitaminas	Regulador de crecimiento. Estimula procesos metabólicos para provocar una mejor expresión del potencial genético del cultivo.	1 L/mz 1 a 2 L/ha dependiendo del tamaño del árbol	Mejor floración y cuaje del fruto. Mayor resistencia a las adversidades climáticas. Incremento en la cantidad y calidad de las cosechas

ATENCIÓN: ATENCIÓN: La información contenida en el cuadro es una sugerencia de uso, el momento de aplicación y productos puede ajustarse a las condiciones agroclimáticas propias de cada región y país.

Aprenda más en





Desarrollo vegetativo												Desarrollo vegetativo			
Floración											Floración				
Cuaje de frutos													Cuaje de frutos		
Desarrollo y llenado de frutos												Desarrollo y llenado de frutos			
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
Verano			Invierno								Verano				
Mavrik 24 EW	Rimon 10 EC	Kohinor 35 SC	Kahinor 35 SC	Galli Ultra 39.6 SC	Pyrinex 48 EC	Mavrik 24 EW	Bralic 12.5 EC	Kohinor 35 SC	Rimon 10 EC	Rimon 10 EC	Kohinor 35 SC	Pyrinex 48 EC			
Bralic 12.5 EC	Bralic 12.5 EC	Acaristop 50 SC			Instar 1.8 EC					Bralic 12.5 EC	Bralic 12.5 EC	Bralic 12.5 EC			
Mastercop	Mirage 45 EC	Mirador 25 EC		OxibacMix 53 WP	Mastercop	Supreme 40 EW	Mirador 25 EC	Orius 25 EW	Mirage 45 EC	Mastercop 6.6 SL Mirage 45 EC	Mastercop	Molto 49 EC Hidrocop 50 WP			
Expert Grow	Agrosol		Expert Grow	Expert Grow	Agrosol	Expert Grow	Expert Grow		Agrosol	Agrosol					

ATENCIÓN: ATENCIÓN: La información contenida en el cuadro es una sugerencia de uso, el momento de aplicación y productos puede ajustarse a las condiciones agroclimáticas propias de cada región y país.

Aprenda
más en

