

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Ametrex 80 WG

HERBICIDA-TRIAZINA
AMETRINA
CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: Ametrex 80 WG es un herbicida sistémico, absorbido principalmente a través de las raíces, con translocación acrópeta por el xilema y acumulándose en los meristemas apicales, inhibe la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Ametrex 80 WG puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. Utilice boquilla de abanico plano tipo 8002 ó 8003. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo. Se recomienda lavar el equipo y utensilios con suficiente agua.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de hasta 400 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ y REPÚBLICA DOMINICANA.

CULTIVO	MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Chiquizacillo <u>Borreria</u> spp Verdolaga <u>Portulaca oleracea</u> Mozote <u>Bidens pilosa</u> Tomate silvestre <u>Solanum nigrum</u>	2-3 Kg/ha(1.4-2.1 Kg/mz)
Piña <u>Ananas comusus</u>	Canutillo <u>Commelina difusa</u> Alambrillo <u>Digitaria sanguinalis</u> Pincelillo <u>Emilia sonchifolia</u> Zacate cabezón <u>Paspalum</u> sp. Liendre de puerco <u>Echinochola colonum</u> Bolsa de pastor <u>Capsella bursa as pastoris</u> Nervillo <u>Drymaria villosa</u>	1.8-5 Kg/ha(1.26-3.5 Kg/mz)

USOS APROBADOS EN: NICARAGUA

CULTIVO	MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Alambrillo <u>Digitaria</u> spp Liendre de puerco <u>Echinochola colonum</u> <u>Eleusine indica</u> <u>Amaranthus</u> spp. Mozote <u>Bidens</u> spp.	3-4 Kg/ha
Banano y plátano <u>Musa</u> spp		
Piña <u>Ananas comusus</u>		

EPOCA DE APLICACIÓN: Pre y postemergencia de la maleza, cuándo esta tenga 4-5 hojas verdaderas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar 2 a 3 ciclos pre y postsiembra del cultivo, según se necesite. No exceder los 10 kg de producto comercial por ciclo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No procede ya que se aplica al inicio del cultivo. Para el caso de la piña debe respetarse al menos 160 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: Ametrex 80 WG no es fitotóxico a las dosis recomendadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto, en caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. No es inflamable ni explosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, vómitos, ataxia, debilidad muscular, alergias, urticarias y dificultad para respirar.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lave la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios, realice la respiración artificial. Acuda un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave abundantemente con agua, manteniendo los párpados bien abiertos por lo menos 15 minutos. Acuda a un oftalmólogo.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560 / 2232-0735
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	Belice	231-1548
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	2289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	269-2741
Hospital Dr. Luis E. Aybar	República Dominicana	684-3478
Hospital Dr. Francisco Moscoso	República Dominicana	681-6922/2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

**ADAMA AGAN, LTD.
P. O. BOX 262 ASHDOD 7710201, ISRAEL
TELÉFONO: 972 (8) 851-5211
FAX: 972 (8) 852-2806**

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAIS	No. DE REGISTRO	FECHA REGISTRO
Guatemala	898-9	05-03-13
Belice	003-7	16-12-09
El Salvador	AG.2002-09-648	31-01-13
Honduras	445, F224, T1	14-06-01
Nicaragua	AC-026K-5-2002	08-01-02
Costa Rica	4666	30-04-01
Panamá	1413	18-04-11
Rep. Dominicana	3353	16-10-09

