

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA



# BURNER 15 SL

HERBICIDA- ACIDO FOSFONICO  
GLUFOSINATE AMMONIUM



**ATENCIÓN**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**

DENSIDAD: 1,07 g/ml a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.  
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



**USO AGRONÓMICO:** Herbicida post-emergente de contacto no selectivo, con cierta acción sistémica, para ser aplicado en bandas dirigido a malezas anuales. Se absorbe principalmente por las hojas de las plantas en activo crecimiento.

**MODO DE ACCIÓN:** Se absorbe principalmente por las hojas de las plantas en activo crecimiento, afectando la fotosíntesis y produciendo finalmente la muerte de las malezas tratadas. Su mecanismo de acción es sobre la inhibición de la síntesis de la enzima glutamino sintetasa, evitando el proceso fotosintético de las malezas.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Puede aplicarse con equipo terrestre de mochila o accionado por tractor. Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Utilice de 200 a 250 l/ha de caldo. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto, agite y termine de llenar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5,5 a 6,5 Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



**RECOMENDACIONES DE USO**  
**USO AUTORIZADO EN: HONDURAS, PANAMA, REPÚBLICA DOMINICANA.**

**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Café <i>Coffea arabica</i> Banano y Plátano <i>Musa sp.</i> Caña de azúcar <i>Saccharum sp.</i> Palma africana <i>Elais guineensis Jacq.</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Lechosa <i>Carica papaya</i> Mango <i>Mangifera indica</i> Cítricos <i>Citrus spp</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Repollo <i>Brassica oleracea var capitata</i> Brócoli <i>Brassica oleracea var italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea var botrytis</i> Aguacate <i>Persea americana</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Uva <i>Vitis vinifera</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Piña <i>Ananas comosus</i> Ornamentales Yuca <i>Manihot esculenta</i> Malanga <i>Colocasia esculenta</i> Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i> Okra <i>Hibiscus esculentus</i> Cacao <i>Theobroma cacao L.</i> Calabaza <i>Cucurbita máxima</i> Guayaba <i>Psidium guajava</i> Camote <i>Impomoea batatas</i>	Siempre viva <i>Commelina diffusa</i> ; Avenilla amarilla <i>Eragrostis mexicana</i> ; Flor <i>Melampodium divaricatum</i> ; Zacate de corona <i>Cyperus ferax</i> ; Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> ; Arrocillo <i>Echinochloa sp.</i> ; Mielcilla <i>Galinsoga ciliata</i> ; Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> ; Zacate ratón <i>Oplismenus burmannii</i> ; Cinquillo <i>Drymaria cordata</i> ; Zacate de corona <i>Cyperus ferax</i> ; Mielcilla <i>Galinsoga ciliata</i> ; Guarda rocío <i>Digitaria sanguinalis</i> ; Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> ; Guarda rocío <i>Digitaria sanguinalis</i> ; Pata gallina <i>Eleusine indica</i> ; bledo <i>Amaranthus spp.</i> ; mozote negro <i>Bidens spp.</i> ; hierba buena <i>Borreria spp.</i> ;	1,5-2 L/ha (1,05-1,4 L/mz) o 7,5-10 mL/Litro en un volumen de 200 litros de agua	Aplicación en Post-emergencia entre los surcos dirigida a las malezas. Usar pantalla. Malezas en pleno crecimiento

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Se presenta irritación de la piel y los ojos. Es nocivo si se ingiere.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502) 2251-3560/ 2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 cel. 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e información de Medicamentos y Toxicos	(507) 523-4948
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar	684-3478
	Hospital Dr. Francisco Moscoso	681-6922/291

**PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

**PELIGROS FÍSICOQUÍMICOS:** el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólcetelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

**AVISO DE GARANTÍA:** El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

**FORMULADO POR: ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA**  
**Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca**  
**Tels: 5-3799771 + 74 - 3799715**  
**BARRANQUILLA, COLOMBIA**

**IMPORTADOR:**

PAÍS	Nº DE REGISTRO
GUATEMALA	
EL SALVADOR	
HONDURAS	1047,F489,TI
NICARAGUA	
PANAMÁ	8388
REP.DOMINICANA	

**NÚMERO DE LOTE:**  
**FECHA DE FORMULACIÓN:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Aplicación en Post-emergencia entre los surcos dirigida a las malezas en crecimiento.

**INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:** Sin restricción, ya que se aplica al inicio del cultivo o en forma localizada.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal.

**FITOTOXICIDAD:** es fitotóxico si se aplica al cultivo. Aplique directamente a la maleza a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**

