¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA

Nimitz 48 EC

NEMATICIDA – HETEROCYCLIC FLUOROALKENYL SULFONE
FLUENSULFONE

ATENCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

Disolvente: Propylene carbonate

DENSIDAD: 1.1978 a 20ºC

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Actúa como nematicida de contacto con actividad residual, causando un efecto irreversible después de la aplicación, que se traduce en un cese de la alimentación, parálisis, efecto ovicida y finalmente la muerte.

MODO DE ACCIÓN: NIMITZ 48 EC es un nematicida que actúa por contacto, afecta todos los estados activos del ciclo de vida del nematodo, inhibiendo la alimentación y causando la muerte de adultos y juveniles. **NIMITZ 48 EC**, ocasiona una pérdida de movilidad y posterior parálisis en adultos y juveniles, antes de la muerte. Los huevecillos tratados son inviables y cuando llegan a eclosionar los juveniles no sobreviven.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aplicar **NIMITZ** 48 EC mediante riego por goteo o superficie aplicada e incorporado

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Realizar una sola aplicación de **NIMITZ 48 EC**, **10 días antes del trasplante.** Aplicar un riego de aproximadamente 10 m^3 de agua, el pH del agua debe de estar dentro de un rango de 5 a 7, 48 a 24 horas antes de aplicar el tratamiento. Durante la aplicación de **NIMITZ 48 EC** emplear un volumen mínimo de 30 m^3 de agua, distribuidos de la siguiente manera: primer tercio de agua previo a la aplicación, en el segundo tercio se inyecta el producto **NIMITZ 48 EC** y se finaliza con el último tercio de agua sin producto para favorecer su movimiento. Se recomienda un tercer riego de 10.000 litros de agua/ha mínimo, 2-4 días después de la aplicación de producto como parte de la preparación del suelo previo al trasplante. **La irrigación dependerá del tipo de suelo: para suelos arenosos se deben usar volúmenes cercanos a los 30 m^3/ha, el volumen puede ser mayor en suelos con mayor contenido de arcilla.**

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, PANAMA Y REPÚBLICA DOMINICANA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pepino Cucumis sativus Calabaza Cucurbita sp. Calabacita Cucurbita sp. Melón Cucumis melo Sandia Citrullus vulgaris Chayote Sechium edule Okra Hibiscus esculentus	Nematodos Meloidogyne incognita	2.0 L/ha	Aplicar un riego de aproximadamente 10.000 litros de agua/ha, 48 horas antes de aplicar el producto. Realizar una sola aplicación del nematicida, **10 días antes del trasplante**, en el segundo tercio del riego. Volumen mínimo de aplicación: 30.000 litros de agua. Se recomienda un riego de 10.000 litros de agua/ha, 2-4 días después de la aplicación del producto. **NO REALIZAR APLICACIONES POSTERIORES AL TRANSPLANTE**.
Tomate Lycopersicon esculentum Mill Berenjena Solanum melongena Chile Capsicum annum			

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 10 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Esperar 12 horas.

FITOTOXICIDAD: no es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: no es conveniente mezclarlo con otros agroquímicos.

CONTRAINDICACIONES
No aplique **NIMITZ 48 EC** vía foliar en ninguna etapa del cultivo ni trasplante plántulas con menos de dos hojas verdaderas en áreas tratadas con **NIMITZ 48 EC.**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: los síntomas de la intoxicación por vía oral son diminución de actividad motriz y desorientación, por vía dermal eritema en la piel y por vía inhalatoria disminución de la actividad y respiración anormal.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano.
EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	**PAÍS**	**TELÉFONO**
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560 / 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	2289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	523-4948
Hospital Dr. Luis E. Aybar	República Dominicana	684-3478
Hospital Dr. Francisco Moscoso	República Dominicana	681-6922/291

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

PELIGROS FISICOQUÍMICOS: el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLÍMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS AREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recoléctelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de éste producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, sí se emplea o no de acuerdo a las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

FORMULADO POR: **ADAMA MAKHTESHIM, LTD.**
P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TELÉFONO: (972) 8-629-6619
FAX: (972) 8-629-6019

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	**NÚMERO REGISTRO**
GUATEMALA	
HONDURAS	
NICARAGUA	
PANAMÁ	8707
REP.DOMINICANA	5663