

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Zamir 40 EW

FUNGICIDA-TRIAZOL, IMIDAZOL
TEBUCONAZOL, PROCLORAZ

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: N, N - Dimethyl Octanamida

DENSIDAD: 1.05-1.06 g/ml

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Tebuconazol y el Procloraz son fungicidas sistémicos inhibidores de la síntesis del ergosterol, son de rápida absorción y tienen acción protectante, curativa y erradicante. El tebuconazol se transloca en la planta en dirección acrópeta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilizar una bomba de espalda manual del 18 litro con una boquilla de cono hueco y un volumen de 150 l/ha.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar botas de hule, respirador, anteojos, guantes, mameluco o delantal largo. No comer, beber o fumar durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el viento. Aplicar el producto en días serenos para evitar la deriva sobre cultivos sensibles. Luego de la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador (incluyendo filtros) repetidas veces. Finalizadas las tareas, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, REPUBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC*	PR**
Café <i>Coffea arabica</i>	Ojo de gallo <i>Mycena citricolor</i>	1.25-1.5 l/ha	21 días	Cuando haya secado el follaje
Arroz <i>Oryza sativa</i>	<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Rhizoctonia Helminthosporium sp</i> , Mancha lineal <i>Pyricularia oryzae</i> , Tizon de la hoja	0.75 L/ha	35 días	Cuando haya secado el follaje
Banano <i>Musa sapientum</i> Platanos <i>Musa paradisiaca</i>	<i>Mycosphaerella musicola</i> Sigatoka amarilla. <i>Mycosphaerella fijiensis</i> Sigatoka negra	0.4 l/ha.	15 días.	Cuando haya secado el follaje
Maíz <i>Zea mays</i>	Complejo fungoso de la lámina foliar: <i>Phyllachora maydis</i> , Mancha de hierro. <i>Helminthosporium maydis</i> . Tizon foliar. <i>Curvularia sp</i> , Mancha de la hoja	0.5 L/ha	21 días	Cuando haya secado el follaje

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se realizan en Arroz, 2 aplicaciones durante el ciclo del cultivo; la primera entre los 15 a 30 días después de la germinación para el control de *Rhizoctonia solani* y la segunda aplicación entre los 80 y 95 días después de la germinación para el control de *Pyricularia oryzae* y *Helminthosporium sp.*, en los demás cultivos tres o cuatro veces por año.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Cuando el arroz tenga 15-30 días y cuando tenga 80-95 días. En los demás cultivos tres o cuatro veces por año.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Arroz 35 días. Los demás 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ingresar al área tratada una vez que haya secado el producto.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayor parte de los fungicidas, insecticidas y coadyuvantes. No se recomienda mezclar con materiales fuertemente alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase alejado de los niños y personas inexpertas. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, ropa, utensilios de uso doméstico. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. No es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Nocivo por inhalación. Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Enrojecimiento, lagrimeo.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: De a beber 3 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dar a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN: INSTITUCIÓN

Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital San Rafael, Santa Tecla
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr. Moscoso Puello

PAÍS

Guatemala 2251-3560 / 2232-0735
Belice 231-1548
El Salvador 2525-5800 ext. 148 y 149
Honduras 232-2322 / 232-2316
Nicaragua 2289-4514
Costa Rica 2223-1028
Panamá 523-4948
República Dominicana 6843672
República Dominicana 6816922

TELÉFONO

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. No utilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taponarlo y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos veces más; después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.

FORMULADO POR:

ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA
Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca
Tels: 5-3799771 + 74 - 3799715
BARRANQUILLA, COLOMBIA

IMPORTADO POR:

PAÍS
REP. DOMINICANA

NÚMERO REGISTRO
4773

FECHA REGISTRO
12-03-15