

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Odeon 72 SC

FUNGICIDA-CLORONITRILO
CLOROTALONIL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO EXISTE

DENSIDAD: : 1.30-1.38 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: El Odeon 72 SC es un fungicida no sistémico de contacto de amplio espectro. Es efectivo contra muchas enfermedades causadas por hongos que dañan los cultivos. Actúa como protectante de plantas. El hongo pierde la viabilidad de las células, impide que las células del hongo puedan obtener la energía necesaria para infectar las plantas. Actúa inhibiendo la activación de enzimas esenciales, evitando la obtención de la energía necesaria para la infección de plantas al reaccionar con grupos SH.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Odeon 72 SC puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre utilizando de 200 a 400 litros de agua por hectárea. Utilice boquillas de cono hueco. No es corrosivo al equipo de aplicación. Para aplicaciones vía aérea, utilice 18 litros de agua por hectárea para banano.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique a una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, REPUBLICA DOMINICANA, COSTA RICA Y PANAMÁ.

CULTIVO	ENFERMEADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Banano-Plátano Musa AAA Musa Aab	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var <i>dif ormis</i>	0.75-1.75 L/ha de producto comercial 0.52 o 1.23 L/MZ

Usar un mínimo de 18 litros de caldo por hectárea cada 4-20 días, de acuerdo a la presión de la enfermedad. No combine Odeon 72 SC con aceite agrícola, ya que se puede producir un amarillamiento superficial que no es permanente.

Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.75-2.0 L/ha o 1.23-1.4 L/MZ
---------------------------	---	-------------------------------

Iniciar las aplicaciones al primer síntoma de enfermedad y continuar cada 7 días por la temporada completa.

Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 l/ha o 1.75 L/MZ
-------------------------------	--	----------------------

Iniciar las aplicaciones al brotamiento de las plantas y continuar cada 7 días o menos, según sean las condiciones climáticas y la presión de las enfermedades.

USO AUTORIZADO EN: NICARAGUA

CULTIVO	ENFERMEADES QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA
Banano-Plátano Musa AAA Musa Aab	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var <i>dif ormis</i>	1.2-1.5 L/ha de producto comercial
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Alternaria Alternaria</i> sp	1.5-2.5 L/ha de producto comercial
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	<i>Colletotrichum</i> sp.	1.75 L/ha de producto comercial
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 L/ha o 1.75 L/MZ

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparezcan las primeras manifestaciones de presencia de las enfermedades.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 1 aplicación a los 7-15 días en papa y melón; en banano y plátano a los 4-20 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Banano: 0 días, melón y papa: 7-14 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 0 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad. No combine Odeon 72 SC con aceite agrícola, ya que se puede producir un amarillamiento superficial (en el cultivo de banano) que luego desaparece.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con fertilizantes alcalinos, caldo bordelés, sulfato de lima y cal. Compatible con productos utilizados normalmente en los cultivos recomendados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, forrajes. Transpórtese y almacéne bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto. Almacene y transporte aparte de herbicidas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta irritación de la piel y un ligero enrojecimiento de los ojos, alergias temporales, irritación bronquial moderada. Si es ingerido en grandes cantidades, produce irritación del tracto gastrointestinal.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No induzca al vómito. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. Llame a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua. Mantenga los párpados bien abiertos. Contacte inmediatamente a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Centro de Información y Asistencia Toxicológica
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital Nacional Rosales
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro Nacional de Intoxicaciones
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos

PAÍS

Guatemala
Belice
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá

TELÉFONO

2251-3560
231-1548
2231-9262
232-2322 / 232-2316
2289-4514
2223-1028
269-2741



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 8410001, ISRAEL
TELÉFONO: (972) 8-629-6619
FAX: (972) 8-629-6019

PAÍS

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP.DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

898-91
0021-7
8702380
408,F236,TII
MC-054B-2-2006
8702380
1968e
3907

FECHA DE REGISTRO

05-12-14
25-04-07
14-09-2015
16-06-09
20-12-06
04-05-10
24-01-07
15-03-12

IMPORTADO POR: Según cliente.

DISTRIBUIDO POR: