

# Banjo Forte

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně brambor proti plísni bramborové.



Plíseň dostane na banjo. Forte.

## Výhody použití

- ▲ Originální kombinace dvou osvědčených účinných látek
- ▲ Tři způsoby účinku: kontaktní + systemický + sporocidní
- ▲ Použitelný po celou dobu aplikační sezóny - až 4 ošetření
- ▲ Účinnost i na *Sclerotinia sclerotiorum*
- ▲ Zabráňuje přenosu infekce z natě na hlízy
- ▲ Dvojnásobná ochrana listové plochy i hlíz
- ▲ Dvě fungicidní látky za cenu jedné
- ▲ Podporuje vysokou kvalitu brambor
- ▲ Vysoká odolnost proti smyvu deštěm již 30–60 minut po aplikaci

## Působení

Přípravek Banjo Forte je kombinovaný fungicid obsahující 2 účinné látky: dimethomorph a fluazinam.

Dimethomorph je systemicky působící látka, která inhibuje tvorbu buněčných stěn houbových patogenů. Látka má preventivní, kurativní, eradikativní a silně antispolurační vlastnosti. Působí proti houbám třídy Oomycetes. Fluazinam patří do skupiny účinných látek nitroanilinů s kontaktním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Vyniká dobrou reziduální aktivitou a odolností vůči smyvu deštěm.

\* Přípravek v registračním řízení.  
Předpokládána registrace leden 2016.



## Účinné látky:

fluazinam 200 g/l  
dimethomorph 200 g/l

## Balení:

1 l Coex HDPE láhev  
5 l Coex HDPE kanystr

## Dávka vody:

300–600 l/ha



**Banjo Forte** je speciálně vyvinutý fungicid proti plísni bramborové. Obsahuje originální kombinaci dvou osvědčených účinných látek s rozdílným mechanismem účinku. Spolehlivě zabrání přenosu infekce z listů do hlízy. Je použitelný po celou sezónu, navíc za příznivou cenu.

### Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Brambory	plíseň bramborová	1 l/ha	300–600 l/ha	7	Fáze plodiny od: 31 BBCH do: 91 BBCH Max. počet aplikací v plodině: 4x Interval mezi aplikacemi 7–10 dní Způsob aplikace: postřik

OL - ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

Poznámka č.1: Ošetření se provádí preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby v intervalu 7–10 dní. Nižší dávka se používá při aplikaci v první polovině vegetace, vyšší dávka při silnějším infekčním tlaku plísně bramborové.

## Praktické možnosti aplikace

### Brambory

Inovativní dvousložkový fungicid Banjo Forte je speciálně vyvinut zejména pro razantní ochranu brambor proti plísní bramborové. Poskytuje dvojnásobnou ochranu listové plochy i hlíz. Zabraňuje přenosu infekce z natě do hlízy. Má rovněž i výrazné vedlejší účinky na další choroby brambor. Zejména na *Sclerotinia sclerotiorum*, kterou kontroluje velmi dobře. Částečně účinkuje i na *Alternaria* spp. V případě silného výskytu alternárií doporučujeme přidat specialistu Mirador (azoxystrobin 250g/l).

### Jednoduché a flexibilní použití

Díky svému složení je univerzálně použitelný po celou dobu aplikační sezóny. Je povolen aplikovat až 4x za sezónu. Formulace vykazuje excelentní odolnost proti dešti, a to již za 30–60 minut po aplikaci. Je dobře mísitelný s insekticidem Bulldock a graminicidem Agil. Registrovaná dávka 1 l/ha je dávkou maximální. V podmínkách počátku infekce a při nižším tlaku lze použít i dávku 0,8 l/ha. Podporuje vysokou kvalitu brambor. Za skvělou cenu.

### Tank mix s Velocity

Do postřiku rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity zvýší účinnost fungicidu a tím prokazatelně zvyšuje výnos pěstovaných plodin.