

Graminacid ve formě emulgovatelného koncentráту určený zejména na hubení chundelky metlice a ovsa hluchého v obilninách na jaře.



Nikdy není pozdě

Výhody použití

- ▲ Ověřené řešení chundelky metlice na jaře včetně jejich rezistentních forem
- ▲ Vynikající na oves hluchý v jarním ječmeni
- ▲ Nejširší aplikační okno
- ▲ Spolehlivost i na přerostlé trávy
- ▲ Za hodinu může pršet

Složení a působení přípravku

Účinná látka pinoxaden patří do skupiny phenylpyrazolinů. Působí systemicky a inhibuje enzym acetylkoenzym A karboxylázu (ACC) na dvou místech: v chloroplastu i v cytoplasmě. V důsledku toho dochází v meristematických pletivech citlivých druhů jednoděložných plevelů k blokování jejich růstu. Do rostlin účinná látka vstupuje přes listovou plochu a odsud je rychle translokována floémem do meristematických pletiv. Citlivé

jednoděložné jednoleté plevle odumírají během 2–3 týdnů po aplikaci.

Minimální omezení použití

Přípravek **Timeline®** lze bez omezení použít v ochranných pásmech jak povrchových, tak podzemních vod. Ochranné vzdálenosti s ohledem na ochranu zdraví lidí jsou 5 m, a to pro všechny typy redukčních trysek.

Praktické možnosti aplikace

Timeline® se používá v komfortním rozsahu teplot 1–25 °C. Při vyšších teplotách přípravek neaplikujte. Případný déšť hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost přípravku. Nedoporučuje se rovněž při aplikaci používat trysky s přísáváním vzduchu kvůli tvorbě hrubého kapénkového spektra, které způsobuje odsakování kapiček od povrchu listů plevle, což může snížit celkovou účinnost.



Účinná látka:

50 g/l pinoxaden

Formulace:

emulgovatelný koncentrát

Balení:

5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200–400 l/ha



Timeline® je vysoce účinný graminacid pro kontrolu zejména chundelky metlice, ovsa hluchého a jílků v obilninách na jaře. Má široké aplikační okno BBCH 31–39, účinkuje v rozpětí teplot 1–25 °C, a to i na odrostlejší plevle, a zároveň je bezpečný pro pěstované plodiny.

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k plevelům
Ječmen jarní	oves hluchý	0,6 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 31 BBCH 2) od 12 BBCH do 31 BBCH
Pšenice	chundelka metlice, oves hluchý	0,6–0,9 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 39 BBCH na jaře 2) od 12 BBCH do 31 BBCH
Ječmen, žito, tritikale	chundelka metlice, oves hluchý	0,9 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 39 BBCH na jaře 2) od 12 BBCH do 31 BBCH

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Sekvenční ošetření

Při jarním ošetřování porostů rovněž proti dvouděložným plevelům přípravky ze skupiny sulfonfylmočoviny a růstových herbicidů (MCPA, MCPP, 2,4D, carfentrazone), platí tato pravidla:

- ▲ Pokud je aplikován **jako první růstový herbicid nebo sulfonfylmočovina**, je nutné s aplikací **Timeline® 14–21 dní počkat**
- ▲ Pokud je **Timeline® aplikován jako první**, je nutné **čekat 7 dní před aplikací růstových herbicidů nebo sulfonfylmočoviny**



Tank mix kombinace

Timeline® lze mísit s fungicidy (Lean-der®, Maxentis®, Soratel®, Slape Trio®, Avastel®) či insekticidy (Kendo® 5 CS). S přípravky obsahující trinexapac (Stem-per®, Moddus®) pouze do fáze BBCH 32 včetně. V pozdější fázi je vhodné dodržet odstup minimálně 5 dnů. Neaplikujte v jarním ječmeni tankmix kombinaci CCC + trinexapac.