

Zvýhodněná obchodní nabídka dvou synergicky účinných fungicidů na ochranu pšenice a ječmenů, zejména při prvních jarních aplikacích. Skládá se z fungicidů Soratel® a Leander® v poměru 20 l + 10 l.



Na choroby chytře

Výhody použití Soratel® Pack

- ▲ Extra účinná formulace prothioconazole (azol) + fenpropidin (morfolin)
- ▲ Registrace do pšenice ozimé a ječmene jarního
- ▲ Synergický efekt v účinku obou látek
- ▲ Ideální použití: první ozdravný zásah s výborným poměrem účinku a ceny

Leander® - výhody použití

- ▲ Jediný samostatný morfolinový přípravek
- ▲ Specialista na padlí travní s výrazným stop efektem na rozvinutou chorobu
- ▲ Silný podpůrný účinek na rzi
- ▲ Dostatečná účinnost i za nízkých teplot
- ▲ Synergický efekt při použití s azoly

Leander® - působení

Fungicid Leander® je systémový fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku fenpropidin ze skupiny morfolinů, jehož mechanismem účinku je inhibice isomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Mechanismus účinku je odlišný od azolů. Fenpropidin je přijímán listy a stonky a následně systémově rozváděn do celé rostliny. Působí proti padlí, rzím a ryňchosporiové skvrnitosti. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Popsané vlastnosti z něj činí velmi vhodného partnera k azolům, jak z hlediska antirezistentní strategie, tak z hlediska posílení a doplnění účinnosti.



Účinná látka:

Leander®:
750 g/l fenpropidin
Soratel®:
250 g/l prothioconazole

Balení:

5 l HDPE kanystř

Dávka vody:

250–400 l/ha



Soratel® Pack je funkční balíček dvou synergicky účinných fungicidů na ochranu pšenice a ječmenů. Určen zejména pro první ozdravný zásah na jaře (T1). Využívá posilujícího účinku fenpropidinu (**Leander®**) na prothioconazole, jehož účinnost je unikátně zesílena formulačními technologiemi Asorbital™ v přípravku **Soratel®**. Poskytuje vynikající kontrolu padlí, septorií a rzí i za nízkých teplot. Za dobrou cenu a bez v omezení v OP.

Návod k použití, registrace Leander®

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL (dny)	Pozn. č.
Ječmen jarní	padlí travní	0,75 l/ha	250–400 l/ha	42	1) max. 2x
	padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, rynchosporiová skvrnitost	0,4 l/ha + Soratel® 0,8 l/ha	250–400 l/ha	42	3)
Pšenice ozimá	padlí travní	0,75 l/ha	250–400 l/ha	42	2) max. 2x
	padlí travní, braničnatka plevová, rez plevová	0,4 l/ha + Soratel® 0,8 l/ha	250–400 l/ha	42	3)

OL = ochranná lhůta (dny) - představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní

Poznámky:

- 1) V ječmeni jarním se přípravek používá proti padlí travnímu preventivně nebo při objevení se prvních příznaků choroby v období od fáze počátku sloupkování do plného metání (BBCH 30–55). Ošetření je možné opakovat po 3–4 týdnech v závislosti na podmínkách a síle infekčního tlaku patogenu.
- 2) V pšenici ozimé se přípravek používá proti padlí travnímu preventivně nebo při objevení se prvních příznaků choroby v období od fáze začátku sloupkování do plného metání (BBCH 30–55). Ošetření je možné opakovat po 3–4 týdnech v závislosti na podmínkách a síle infekčního tlaku patogenu.
- 3) Ošetření se provádí v tank-mix směsi v souladu s návody na jejich použití.

Návod k použití, registrace Soratel® 300 EC

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
Pšenice	braničnatka pšeničná, rez plevová, rez pšeničná, padlí travní	0,8 l/ha	AT	od: 30 BBCH do: 69 BBCH max. 1x v plodině
	fuzariózy klasů	0,8 l/ha	AT	od: 61 BBCH do: 69 BBCH max. 1x v plodině
Tritikale	braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová	0,8 l/ha	AT	od: 30 BBCH do: 69 BBCH max. 1x v plodině
Žito	rynchosporiová skvrnitost, rez žitná	0,8 l/ha	AT	od: 30 BBCH do: 65 BBCH max. 1x v plodině
Ječmen	hnědá skvrnitost, ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene, rez ječná, rynchosporiová skvrnitost	0,8 l/ha	AT	od: 30 BBCH do: 65 BBCH max. 1x v plodině
Řepka olejka	hlízenka obecná	0,7 l/ha	AT	od: 61 BBCH do: 69 BBCH max. 1x v plodině

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Soratel® Pack

Soratel® - výhody použití

První prothioconazole s patentovou formulační technologií Asorbital™

- ▲ Výrazně delší a vyšší účinnost
- ▲ Rychlejší a vyšší odolnost proti smyvu deštěm.
- ▲ Široké registrace v obilí a řepce
- ▲ Samostatné použití i jako komplementární partner pro řadu fungicidů
- ▲ Minimální omezení použití
- ▲ Výborný poměr účinku a ceny

Soratel® - působení

Soratel obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazole. Po aplikaci velmi rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasazeny postřikem. Prothioconazole patří do chemické skupiny triazolinthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Podobně jako strobiluriny působí stimulačně, a tím podporuje zvýšení úrody. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku. Patentovaná formulační technologie Asorbital™ užité vlastnosti přípravku dále výrazně posiluje. Podrobnosti lze nalézt na předchozí dvoustránce katalogu.

Praktické možnosti aplikace Soratel® Pack

Soratel® Pack je koncipován tak, aby umožnil pěstiteli snadné dávkování balíčkových komponentů na hektar. Základní doporučení pro zvolení dávky ošetření Soratel® + Leander® v obilninách je 0,8 l + 0,4 l/ha, tudíž jedním balíčkem ošetříme 25 ha. Na účinnou pomoc v boji proti chorobám takto aplikujeme na jeden hektar masivní dávku 200 g prothioconazole, navíc synergicky podpořenou 300 g fenpropidinu. Tato kombinace zajistí vysoký a razantní účinek v porovnání s jinými koncepty fungicidního ošetření.

Soratel® Pack se nejlépe zhodnotí nasazením na první jarní ozdravný zásah v případě intenzivních porostů, či i jako jediný zásah s vysokou ekonomickou návratností v případě porostů střední intenzity zejména při **celkově sušším** průběhu jara, kdy se kromě padlí listové choroby tolik nemanifestují a nebezpečná situace vypukne až později s nástupem rzí. Obě tyto zdravotní situace však právě Soratel® Pack výborně zvládá.

Pokud čelíte po zimě výskytu stéblolamu, použijte účinného specialistu Mirage® C.





Na první ozdravný zásah Soratel® Pack