

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Brambory	plíseň bramborová	0,4 l/ha	200–400 l/ha	7	Preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby Max. počet aplikací v plodině: 4x Interval mezi aplikacemi 7–10 dní

OL - ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování mísitelnost	OL	Poznámka k plodině	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Cibule, cibule šalotka	botrytiniová skvrnitost listů cibule	0,5 l/ha 200–400 l vody/ha	28	od: 15 BBCH, do: 45 BBCH	4) max. 1x 5) pole
Okrasné rostliny do 50 cm	plíseň	0,2 l/ha 500–1000 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 3x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Okrasné rostliny 50–150 cm	plíseň	0,3 l/ha 750–1 500 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 3x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Okrasné rostliny nad 150 cm	plíseň	0,4 l/ha 1 000–2 000 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 2x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Zelenina kořenová a hlíznatá	alternáriová skvrnitost	0,2 l/ha	14	od: 15 BBCH, do: 45 BBCH	4) max. 2x 5) pole zákaz konzumace natě

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní nebo nakládáním s ošetřenými rostlinami. Interval mezi aplikacemi 7–10 dnů.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do cibule, šalotky a okrasných rostlin nad 150 cm.

Custodia®

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu se systémovým účinkem k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné a révy vinné proti padlí révovému.



Váš poklad bude v bezpečí

Výhody použití

- ▲ Pro použití v řepce bez omezení v OP II. st.
- ▲ Jedinečná a vyvážená kombinace azol + strobilurin
- ▲ Vysoká preventivní i kurativní účinnost
- ▲ Zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně
- ▲ Zvyšuje pružnost šesulí a prokazatelně omezuje ztráty výdrolom (min. plus 0,1 t/ha)
- ▲ Odolnost vůči smyvu deštěm již hodinu po aplikaci
- ▲ Ochrana proti UV záření
- ▲ Vynikající účinnost na všechny druhy *Alternaria* spp. (černě)

Působení

Přípravek Custodia® je systémový fungicidní přípravek obsahující dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole s rozdílným mechanismem účinku. Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence

obecné. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty se systemickým a translaminárním působením. Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Vykazuje také antisporelační působení. Aplikuje se před vznikem nebo na počátku infekce. Působí dlouhodobě po dobu 3–8 týdnů. Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy s protektivním, kurativním a eradikativním působením. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce olejce růstové regulační efekt.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Custodia® je fungicid speciálně vyvinutý zejména na tzv. T3 aplikace do květu řepky. Jedinečná kombinace účinných látek propůjčuje praxi řadu zajímavých vlastností. Kromě vysoké účinnosti



Účinná látka:

120 g/l azoxystrobin
200 g/l tebuconazole

Formulace:

suspenzní koncentrát

Balení:

5 l kanystr HDPE

Dávka vody:

200–400 l/ha



Custodia® je speciálně vyvinutý fungicid proti hlízence v řepce a padlí révovému ve vinné révě. Prokazatelně zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Zlepšuje pružnost šesulí a tím omezuje ztráty výdrolom.