



Jednoduše porosteme spolu

Mirage® C

Fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně pšenice ozimé proti padlí travnímu, fuzariózám, stéblolamu, helmintosporiíze pšenice, braničnatce plevové a braničnatce pšeničné a k ochraně ječmene ozimého proti stéblolamu, padlí travnímu, rynchosporiové skvrnitosti ječmene a hnědé skvrnitosti ječmene.



Základ zdravého porostu



Výhody použití

- ▲ **Jiný mechanismus účinku (dle FRAC)**
přináší vysokou úroveň ochrany před prvními infekcemi ozimých obilnin
- ▲ Účinkuje na **všechny formy** pravého stéblolamu a nehrozí zde křížová rezistence s jinými skupinami fungicidů
- ▲ Kontroluje i **další choroby časného jara** jako je rhizoctonia, fuzariózy, padlí travní a listové skvrnitosti
- ▲ **Hlubkově systémový účinek**
- účinná látka je rozváděna v rámci celé rostliny (akropetálně)

Působení

Mirage® C je fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí, který je určen k ošetření pšenice ozimé a ječmene ozimého proti listovým chorobám. Účinná látka cyprodinil zasahuje do životního cyklu houbových patogenů zejména

na v průběhu penetrace a růstu mycelia uvnitř rostlinných tkání. U některých patogenů (*Erysiphe graminis*) navíc inhibuje sporulaci. Biochemický účinek cyprodinilu spočívá v narušení syntézy methioninu a sekrece hydrolytických enzymů z buněk patogenů. *Cyprodinil* je dobře a rychle přijímán listy. V rostlinách se šíří směrem nahoru (akropetálně) xylémem a transla-minárně. Systemické vlastnosti přispívají k dobré distribuci účinné látky uvnitř rostlinných tkání, čímž se snižuje riziko smyvu z povrchu ošetřených rostlin.

Praktické možnosti aplikace

Mirage® C je fungicid, který má své místo zejména v prvních aplikacích přezimujícího porostu pšenice či ječmene, který je potřeba ozdravit z komplexu chorob, které se v průběhu zimy, zejména na krčcích, bázích odnoží i listech, nashromáží

Účinná látka:

750 g/kg cyprodinil

Formulace:

ve vodě dispergovatelné granule

Balení:

1 kg, 5 kg v obalech:
PAP / PET / AI / PE krabice
nebo HDPE kanystř

Dávka vody:

200–400 l/ha



Mirage® C je fungicid prvního ošetření ozimých obilnin na ozdravení po přezimování. Účinná látka z jiné skupiny vynikajícím způsobem kontroluje všechny formy pravého stéblolamu. Účinkuje i na další choroby časného jara jako jsou rhizoctonia, fuzariózy, padlí travní a listové skvrnitosti.