

Banjo® 500 SC

NOVINKA

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně brambor proti plísni bramborové.



Bez něho to dobře nehraje

Výhody použití

- ▲ Dlouhodobý kontaktní účinek
- ▲ Reziduální i antisporulační účinek
- ▲ Vysoká odolnost proti smyvu deštěm již za 15 min.
- ▲ Dobrý vedlejší účinek na *Alternaria* spp.
- ▲ Použití kdykoliv během vegetace
- ▲ Komplementární partner k Rival® Duo

Působení

Banjo® 500 SC je fungicid obsahující účinnou látku fluazinam. Fluazinam patří do skupiny účinných látek nitroanilinů s kontaktním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Vyniká dobrou reziduální aktivitou a odolností vůči smyvu deštěm již za 15 minut. Po aplikaci vytváří na povrchu rostliny fungicidní film, který zabraňuje klíčení

spor. Rovněž je fungicidní film vytvořen i na půdě, kde brání proniknutí spor k hlízám a jejich následné infekci.

Praktické možnosti aplikace

Banjo® 500 SC je fungicid, který obsahuje fluazinam, v bramborářství celosvětově používanou látku s vysokou účinností na plíseň bramborovou. Protože se jedná o látku kontaktní, je přirozeným partnerem pro doplnění a na prostřídání účinnosti se systemickými fungicidy. Aplikuje se preventivně v intervalu 10–14 dní. Při nižším infekčním tlaku a na počátku vegetace stačí dávka 0,3 l/ha. Při vyšším tlaku či v druhé části vegetace a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz pak používáme 0,4 l/ha.



Účinná látka:

500 g/l fluazinam

Balení:

1 l HDPE láhev,
5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200–500 l/ha



Banjo® 500 SC je kontaktní fungicid obsahující účinnou látku fluazinam. Spolehlivě účinkuje na plíseň bramborovou s vedlejším účinkem na *Alternaria* spp. Dlouhodobý reziduální a antisporulační účinek se vhodně doplňuje s odolností proti smyvu deštěm. Výborný partner do kombinace či fungicidních sledů s Rival® Duo.

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Brambory	plíseň bramborová	0,4 l/ha	200–400 l/ha	7	Preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby Max. počet aplikací v plodině: 4x Interval mezi aplikacemi 7–10 dní

OL - ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

Banjo® + Rival® Duo Pack

Při zakoupení funkčního balíčku **Banjo® + Rival® Duo Pack** postupujeme takto: Rival® Duo používáme zejména na první postřiky v postřikovém programu, a to až do celkově povoleného množství max. 4x za sezonu. Při nižším infekčním tlaku jsou doporučené intervaly mezi postřiky 10–14 dnů, při silném infekčním tlaku pak interval zkracujeme na 7 dnů. Následovat by měl program postavený spíše na kontaktní účinné látce *fluazinam*. (např. Banjo® 500 SC) viz schéma níže. Další možností je přímo kombinovat tyto dva přípravky spolu, a to tak, že snížíme jejich doporučené dávky na nižší hranici a použijeme jako tank-mix. Rival® Duo + Banjo® 500 SC v dávce 2 l + 0,3 l/ha.

Balíček dvou komplementárních fungicidů odmění pěstitele další ekonomickou úsporou pokud zakoupí oba komponenty do svého postřikového plánu společně.

Adama doporučení postřikového plánu

