


Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně cukrovky proti cerkosporióze řepy, rzi řepné, větevnatce řepné a padlí řepnému, k ochraně řepky proti fomové hnilobě a hlízence, k ochraně slunečnice proti fomové hnilobě, hlízence a červenohnědé skvrnitosti, k ochraně řepy krmné proti cerkosporióze, rzi řepné, větevnatce řepné, padlí řepnému a rizoktoniové hnilobě a k ochraně brukve řepáku, lničky seté, hořčice, máku, lnu a konopí proti hlízence.



Nejlepší libero mezi fungicidy

### Výhody použití

- ▲ Flexibilní partner k azolům a prochlorazu
- ▲ Difenconazole + azoxystrobin
  - Kombinace dlouhodobé účinnosti s green efektem
  - Kombinace kurativního i preventivního zásahu s translaminárním efektem v jednom
- ▲ Použitelnost od jara do podzimu

### Působení přípravku

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny  $\beta$  - methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty) má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku

nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Účinná látka difenconazole ze skupiny triazolů zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách - působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenconazol je systémová účinná látka s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

### Praktické možnosti aplikace

Mirador® Uni výborně splňuje nároky pestitele na univerzální, vícesložkový fungicid, který za přijatelnou cenu lze používat prakticky po celou pěstitelskou sezónu. Je již nyní registrován do 8 důležitých polních plodin, a to se ještě dodatečné registrace do obilnin připravují. Představuje totiž výbornou a vyváženou kombinaci, která snoubí dlouhodobou ochranu včetně ku-



### Účinná látka:

125 g/l azoxystrobin  
125 g/l difenconazole

### Formulace:

suspenzní koncentrát

### Balení:

5l HDPE kanistr

### Dávka vody:

200–400 l/ha



**Mirador® Uni** je velmi dobře zaregistrovaný fungicid použitelný do 8 důležitých plodin, a to po celou agronomickou sezónu. Synergické působení látek difenconazole + azoxystrobinu přináší kombinaci dlouhodobosti a kurativního účinku s účinkem preventivním včetně translaminárního efektu a green efektu v jednom.

**Návod k použití, registrace:**

| Plodina            | Škodlivý organismus                                          | Dávkování                  | OL | Poznámka                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| Řepka olejka ozimá | fomová hniloba                                               | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 14–55<br>max. 1x na podzim,<br>nebo 1x na jaře |
|                    | hlízenka obecná                                              | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x                                 |
| Řepka olejka jarní | hlízenka obecná                                              | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x                                 |
|                    | fomová hniloba                                               | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 30–55, max. 1x                                 |
| Slunečnice         | fomová hniloba, hlízenka obecná, červenohnědá skvrnitost     | 1 l/ha (200–600 l vody/ha) | AT | BBCH 20–55, max. 1x                                 |
| Cukrovka           | cerkosporióza řepy, rez řepná, padlí řepné, větevnatka řepná | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | 35 | BBCH 39–49, max. 1x                                 |
|                    | rizoktoniová hniloba                                         | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | 35 | BBCH 38–39, max. 1x                                 |

AT - ochranná lhůta je stanovena odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní. OL = ochranná lhůta (dny).

**Rozšířené povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

| Plodina                     | Škodlivý organismus                                                               | Dávkování                  | OL | Poznámka                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| Řepa krmná                  | cerkosporióza řepy, rez řepná, padlí řepy, větevnatka řepná, rizoktoniová hniloba | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | 35 | BBCH 39–49, max. 2x,<br>interval mezi aplikacemi 21 dnů        |
| Brukev řepák, lnička setá   | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x                                            |
| Hořčice bílá, hořčice černá | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x<br>na semeno                               |
| Hořčice sareptská           | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x                                            |
| Mák setý                    | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x                                            |
| Len setý                    | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x<br>na olej, vlákno, na semeno              |
| Konopí seté                 | hlízenka obecná                                                                   | 1 l/ha (200–400 l vody/ha) | AT | BBCH 59–69, max. 1x, na vlákno,<br>pouze nepotravinářské účely |

rativní účinnosti (difenoconazole) s preventivní účinností včetně translaminárního efektu a green efektu (azoxystrobin) v jednom zásahu.

Mirador® Uni v cukrovce výborně účinkuje proti *Cercospora beticola*, *Erysiphe betae*, *Uromyces betae*, *Ramularia beticola*. Ve slunečnici je účinný proti *Sclerotinia sclerotiorum*, *Leptosphaeria lindquistii*, *Diaporthe helianthi*. Řepku olejku chrání proti *Leptosphaeria maculans* a *Sclerotinia sclerotiorum*.

Pro svou univerzálnost ÚKZÚZ rovněž zaregistroval Mirador® Uni v režimu menšinového použití pro aplikace v máku, hořčici, lnu, lničce, konopí, krmné řepě a brukvi řepáku.

**Tank Mix s Velocity®**

Obecně doporučujeme přidávat do aplikací fungicidů proti houbovým chorobám akceleraátor systemických fungicidů Velocity®, a to nejčastěji v dávce 0,25 l/ha, která pomůže aktivně vtáhnout účinné látky

do rostlinných pletiv, čímž podpoří celkově vyšší i dlouhodobější účinnost zásahu.