

Banjo® 500 SC

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně brambor proti plísni bramborové, cibule a šalotky proti botryotiniové skvrnitosti listů cibule, proti plísním v okrasných rostlinách a proti alternáriové skvrnitosti v kořenové a hlíznaté zelenině.



Bez něho to dobře nehraje

Výhody použití

- ▲ Dlouhodobý kontaktní účinek
- ▲ Reziduální i antisporulační účinek
- ▲ Vysoká odolnost proti smyvu deštěm již za 15 minut
- ▲ Dobrý vedlejší účinek na *Alternaria* spp.
- ▲ Použití kdykoliv během vegetace
- ▲ **Bez omezení v OP II pozemních i povrchových vod**

Působení

Banjo® 500 SC je fungicid obsahující účinnou látku fluazinam. Fluazinam patří do skupiny účinných látek nitroanilinů s kontaktním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Vyniká dobrou reziduální aktivitou a odolností vůči smyvu deštěm již za 15 minut. Po aplikaci vytváří na povrchu rostliny

fungicidní film, který zabraňuje klíčení spor. Rovněž je fungicidní film vytvořen i na půdě, kde brání proniknutí spor k hlízám a jejich následné infekci.

Praktické možnosti aplikace

Banjo® 500 SC je fungicid, který obsahuje fluazinam, v bramborářství celosvětově používanou látku s vysokou účinností na plíseň bramborovou. Protože se jedná o látku kontaktní, je přirozeným partnerem pro doplnění a na prostřídání účinnosti se systemickými fungicidy. Aplikuje se preventivně v intervalu 10–14 dní. Při nižším infekčním tlaku a na počátku vegetace stačí dávka 0,3 l/ha. Při vyšším tlaku či v druhé části vegetace a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz pak používáme 0,4 l/ha.



Účinná látka:

500 g/l fluazinam

Balení:

1 l HDPE láhev,
5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200–500 l/ha



Banjo® 500 SC je kontaktní fungicid obsahující účinnou látku fluazinam. Spolehlivě účinkuje na plíseň bramborovou s vedlejším účinkem na *Alternaria* spp. Dlouhodobý reziduální a antisporulační účinek se vhodně doplňuje s odolností proti smyvu deštěm.

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Brambory	plíseň bramborová	0,4 l/ha	200–400 l/ha	7	Preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby Max. počet aplikací v plodině: 4x Interval mezi aplikacemi 7–10 dní

OL - ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

Ménšinnové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování mísitelnost	OL	Poznámka k plodině	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Cibule, cibule šalotka	botryotiniová skvrnitost listů cibule	0,5 l/ha 200–400 l vody/ha	3	od: 15 BBCH, do: 45 BBCH	4) max. 1x 5) pole
Okrasné rostliny do 50 cm	plíseň	0,2 l/ha 500–1000 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 3x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Okrasné rostliny 50–150 cm	plíseň	0,3 l/ha 750–1 500 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 3x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Okrasné rostliny nad 150 cm	plíseň	0,4 l/ha 1 000–2 000 l vody/ha (postřik) 8 000–30 000 l/ha (zálivka)	2	od: 10 BBCH, do: 89 BBCH (mimo BBCH 40–49)	4) max. 2x 5) venkovní prostory, chráněné prostory 6) produkční plochy
Zelenina kořenová a hlíznatá	alternáriová skvrnitost	0,2 l/ha	14	od: 15 BBCH, do: 45 BBCH	4) max. 2x 5) pole zákaz konzumace natě

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní nebo nakládáním s ošetřenými rostlinami. Interval mezi aplikacemi 7–10 dnů.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do cibule, šalotky a okrasných rostlin nad 150 cm.