

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k plevelům
Pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé	plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté	0,75–1 l/ha	80–300 l/ha	AT	1) od: 20 BBCH do: 39 BBCH 2) postemergentně
Pšenice jarní	plevele jednoděložné jednoleté	1 l/ha	80–300 l/ha	AT	1) od: 20 BBCH do: 39 BBCH 2) postemergentně

OL = ochranná lhůta (dny). Ochranná lhůta AT je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Aplikujte na suchý porost. Neaplikujte před očekávaným deštěm.

Max. počet aplikací v plodině: 1× na jaře

dělení a dalšího růstu rostlin. Obě látky spolu vykazují výrazné synergické efekty v účinnosti na celou škálu plevelných trav i některých dvouděložných plevelů jako jsou úhorník mnohohlátný, penízek rolní, hořčice rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní a výdrol řepky olejky.

Minimální omezení použití

Přípravek Edaptis® má velmi přijatelný environmentální profil. Přípravek je vyloučen z použití pouze v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. A jen pro aplikaci do pšenice jarní je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se ($\geq 3^\circ$ svažitosti) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití 20 m vegetačního pásu. Ochranné vzdálenosti s ohledem na necílové plodiny jsou 0 m, k vodním plochám jen 4 m a s ohledem na ochranu zdraví 3 m, a to při všech typech redukcí trysek.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Edaptis® byl vyvinut pro špičkovou ochranu obilnin proti širokému spektru plevelných trav a pro situace, kdy některé populace plevelných trav již začínají vykazovat rezistenci na sólo účinné látky, a to jak ze skupiny ACC inhibitorů, tak ze skupiny ALS inhibitorů. Přípravek je jednotně registrován v celé Evropě v plné dávce **1 l/ha**, která ob stojí i v podmínkách masivního konkurenčního tlaku plevelných trav, který se vyskytuje zejména v Anglii nebo v přímořských oblastech kontinentální Evropy a v podmínkách vysoké intenzity pěstování.

V podmínkách České republiky však bude naprosto dostačující účinnost při dávce **0,8 l/ha**, zejména pokud cílíme **na chundelku metlici, jílky, ovsy a lipnici roční**. Pokud je hlavním cílem psárka, volíme pak dávku **1 l/ha**.

Použití smáčedla

Dalšího navýšení účinnosti docílíme použitím vhodného olejového smáčedla. Přidání smáčedla je důležité zejména, pokud aplikace přichází po delší periodě bez srážek, kdy si obecně rostliny vytvářejí silnější voskové vrstvičky na povrchu listů.

Kompletní jarní odplevelení

Jak již bylo popsáno výše, **Edaptis®** vykazuje již sám o sobě i velmi dobrou účinnost na některé dvouděložné plevely jako je úhorník mnohohlátný, penízek rolní, hořčice rolní, ptačinec žabinec, rmen rolní a výdrol řepky olejky. Pro doplnění spektra účinnosti prakticky na všechny hospodářsky důležité plevely pak doporučujeme tankmix: **Edaptis® 0,8 l/ha + Elegant® 0,6 l/ha**. Dobrým partnerem je také herbicid **Trimmer®**, kde volíme dávku **25–30 g/ha**, dle intenzity zaplevelení.

Elegant® 2 FD

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze k ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.



Na křídlech prosperity

Výhody použití

- ▲ Široké spektrum dvouděložných plevelů
- ▲ Dvojitý mechanismus účinku
- ▲ Do pšenice, ječmene i tritikale
- ▲ Ekonomicky zajímavé řešení pro jarní odplevelení obilnin

Působení přípravku

Elegant® 2 FD je systemicky působící herbicid pro postemergentní ošetření proti dvouděložným plevelům. Obsahuje dvě účinné látky florasulam a 2,4-D, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Florasulam inhibuje tvorbu enzymu acetolaktát syntázy (ALS). Symptomy se nejdříve objevují v meristémových pletivech jako chlorózy a nekrózy. 2,4-D způsobuje abnormality v růstu a v rostlinných pletivech a nakonec odumírání celých rostlin. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické

symptomy poškození (abnormality růstu, změna barvy) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7-10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.

Spektrum účinnosti

Elegant® 2 FD je širokospektrální herbicid, který hubí většinu dvouděložných plevelů vyskytujících se v ozimých a jarních obilninách.

Citlivé plevele: heřmánkovité plevele (heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmeny, heřmánek terčovitý), svízel přitula, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, výdrol ozimé řepky), ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční, mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa modrák, pohanka svlačcovitá, rdesno blešníků, úhorník mnohohlý, merlíky, osetroška polní.



Účinná látka:

6,25 g/l florasulam
300 g/l 2,4-D

Formulace:

suspenzní emulze

Balení:

5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200-400 l/ha



Elegant® 2 FD je herbicid proti dvouděložným plevelům obsahující nejpoužívanější osvědčené účinné látky v plných dávkách. Je určen pro **jarní aplikace** do pšenice, ječmene a tritikale. Představuje efektivní a **cenově výhodné řešení**.