



Roste skvěle, bez plevelů

Legato® 500 SC

Selektivní, časně postemergentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro účinnou kontrolu širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na podzim.



Partner do orchestru

Výhody použití

- ▲ Spolehlivá účinnost na řadu dvouděložných plevelů
- ▲ Ideální partner do tankmixu s herbicidem Tolurex® 50 SC
**Tolurex® 50 SC 1,5 l/ha
+ Legato® 500 SC 0,15 l/ha**
 - Ekonomické řešení všech plevelů včetně chundelky metlice již rezistentní na chlortoluron
 - Výborná hektarová cena ošetření.

Působení přípravku

Účinná látka diflufenican je převážně absorbována mladými rostlinkami plevelů v době jejich klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Plevelé pak typicky ztrácejí chlorofyl, vybělují a rychle odumírají. Doba působení účinné látky je typicky kolem 6 měsíců.

Spektrum účinnosti

Plevelé citlivé – plevelé heřmánkovité, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, rozrazil, violky, lipnice roční.

Plevelé méně citlivé – svízel přitula, řepka olejka - výdrol, zemědělm lékařský, chundelka metlice.

Růstová fáze obilnin v době ošetření: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy

Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.



Účinná látka:

500 g/l diflufenican

Formulace:

suspenzní koncentrát

Balení:

5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200–400 l/ha



Legato® 500 SC je selektivní, časně postemergentní herbicid pro účinnou kontrolu širokého spektra dvouděložných plevelů na podzim v pšenici i ječmenech. Je ekonomickým partnerem k herbicidu Tolurex® 50 SC, kde v tankmixu 1:10 vytvoří kompletní řešení všech plevelů včetně chundelky metlice již rezistentní na účinnou látku chlortoluron.