

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL
Pšenice ozimá, ječmen ozimý	plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní. Maximální počet aplikací: 1x v plodině, na podzim.
Dávka vody: 200–400 l/ha, maximální počet aplikací v plodině: 1x, na podzim

Praktické možnosti aplikace

Legato® 500 SC ideálně doplňuje ve snížené dávce 0,15 l/ha osvědčený herbicid **Tolurex® 50 SC** v ekonomické dávce 1,5 l/ha (až 2,0 l/ha). Vytvoří se tak tank mix směs, která velmi dobře zaúčinkuje proti celému spektru hospodářsky škodlivých plevelů, které se na podzim v obilni-

nách vyskytují. Tato kombinace odstraní i ty varianty chundelky metlice, které jsou již rezistentní na účinnou látku chlortoluron. To vše za velmi příjemnou cenu.

Jaké smáčedlo nejlépe zvolit?

Pokud chceme omezit nežádoucí úlet postřiku na necílové plochy, dále prodloužit


a zvýšit účinek přípravků a snížit rizika jejich proplavování do spodních vod, zvolíme specializované půdní smáčedlo **Grounded®**. Optimální dávkování **Grounded®** je odvislé od množství použité vody (viz tabulka dále v katalogu), nejčastěji se však používá dávka 0,25 l/ha.

Koncert na poli

Výborný účinek za výbornou cenu

Tolurex® 50 SC
+ Legato® 500 SC
1,5 (až 2,0) l + 0,15 l/ha

Přidejte půdní smáčedlo
Grounded®
0,25 l/ha



MaxRaptor®

Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v ozimé řepce olejce.



Predátor plevelů

Výhody použití

1. Extra silná formulace

- ▲ o 13 % metazachloru/ha a o 50 % quinmeracu/ha více, než jste byli zvyklí

2. Preemergentní + časné postemergentní aplikace

- ▲ Prodlužuje aplikační okno až do děložních lístků plevelů
- ▲ Vysoká dávka quinmeracu zvyšuje účinnost na svízel i bez vybělení

3. Flexibilní rozpětí dávky 1,75–2 l/ha

- ▲ přináší větší variabilitu použití

4. Jednoduchost použití

5. Vynikající selektivita

- ▲ Jedno z nejšetnějších ošetření v řepce

6. Sekvenční ošetření s Belkar

Působení přípravku

MaxRaptor® je herbicid obsahující dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku: metazachlor a quinmerac. Je ur-

čený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech ozimé řepky olejky.

Účinná látka **metazachlor** je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení, kdy inhibuje klíčení a vzházení. Účinná látka **quinmerac** je přijímána primárně kořeny plevelů a částečně také listy.

Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Náhradní plodiny

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k předčasné zaorávce řepky olejky, lze **na podzim** vysévat jako náhradní plodiny bezprostředně ozimou řepku olejku po kultivaci půdy, nebo ozimé obilniny.



Účinná látka:

375 g/l metazachlor
125 g/l quinmerac

Formulace:

suspenzní koncentrát

Balení:

5 l HDPE kanistr

Dávka vody:

200–400 l/ha



MaxRaptor® je herbicid do řepky s **výrazně vyšším obsahem** osvědčených účinných látek a vynikající **selektivitou**. Nabízí **jistější účinek a flexibilnější dávkování**, než jste byli zvyklí. Možnost preemergentní i časné postemergentní aplikace snižuje riziko nejistých investic, umožňuje precizní načasování postřiku i za nestálého počasí.