

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k plevelům
Ječmen jarní	oves hluchý	0,6 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 31 BBCH 2) od 12 BBCH do 31 BBCH
Pšenice	chundelka metlice, oves hluchý	0,6–0,9 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 39 BBCH na jaře 2) od 12 BBCH do 31 BBCH
Ječmen, žito, tritikale	chundelka metlice, oves hluchý	0,9 l/ha	200–400 l/ha	AT	1) od 21 BBCH do 39 BBCH na jaře 2) od 12 BBCH do 31 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.
Maximální počet aplikací v plodině: 1x.

Sekvenční ošetření

Při jarním ošetřování porostů rovněž proti dvouděložným plevelům přípravky ze skupiny sulfonfylmočoviny a růstových herbicidů (MCPA, MCPP, 2,4-D, carfentrazone), platí tato pravidla:

- ▲ Pokud je aplikován **jako první růstový herbicid nebo sulfonfylmočovina**, je nutné s aplikací **Timeline® 14–21 dní počkat**
- ▲ Pokud je **Timeline® aplikován jako první**, je nutné **čekat 7 dní před aplikací růstových herbicidů nebo sulfonfylmočoviny**



Tank mix kombinace

Timeline® lze mísit s fungicidy (Leander®, Maxentis®, Soratel®, Slape Trio®, Avastel®) či insekticidy (Mavrik® Smart). S přípravky obsahující trinexapac (Stemper®, Moddus®) pouze do fáze BBCH 32 včetně. V pozdější fázi je vhodné dodržet odstup minimálně 5 dnů. Neaplikuj-

te v jarním ječmeni tankmix Timeline® v kombinaci CCC + trinexapac. Díky moderní formulaci není potřeba přidávat smáčedlo.

Tolurex® 50 SC

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách.



Ekonomická kontrola chundelky

Výhody použití

- ▲ Vynikající účinek na chundelku metlici a dvouděložné plevely při nízkých nákladech
- ▲ Použití na podzim i na jaře, a to preemergentně i postemergentně
- ▲ Výborná cena

Působení

Tolurex® 50 SC je přijímán kořeny i listy plevelných rostlin, a proto může být aplikován preemergentně i postemergentně. Tolurex® 50 SC hubí spolehlivě většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů klíčících na podzim jako např.: chundelka metlice, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, hluchavky, pomněnka rolní, chmerek rolní, kolenec rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazil, vikve.

Termín aplikace

Obilniny

V obilninách aplikujte přípravek preemergentně nebo postemergentně od 2. listu obilniny do konce odnožování. Ošetření je možné provádět na podzim nebo brzy na jaře. Tolurex® 50 SC můžete aplikovat i na zmrzlou půdu, nikoliv však na sněhovou pokrývku. Na dvouděložné plevely působí v raných růstových fázích, nepůsobí na svízel přitulu. V případě zaorání plochy ošetřené přípravkem Tolurex® 50 SC nemůže být následnou plodinou oves, můžete však pěstovat jarní ječmen nebo jarní pšenici.



Účinná látka:

500 g/l chlorotoluron

Formulace:

suspenzní koncentrát

Balení:

5 l, 20 l HDPE kanystr

Dávka vody:

200–400 l/ha



Tolurex® 50 SC kontroluje chundelku metlici i další plevely při nízkých nákladech. Osvědčený herbicid široce použitelný na podzim i na jaře do mnoha kombinací.



Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Ječmen ozimý	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	3 l/ha	200–400 l/ha	AT	1)
Pšenice ozimá	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	3 l/ha	200–400 l/ha	AT	1), 2)
Tritikale ozimé	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	2 l/ha	200–400 l/ha	AT	1)

OL = ochranná lhůta. Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.

1) Ošetření se provádí postemergentně od 3. listu obilniny (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29).

Jednoleté dvouděložné plevle se ošetřují do fáze 5–6 listů (BBCH 15–16), dvouděložné do 4 listů (BBCH 14).

2) Tolurex® 50 SC se aplikuje v ozimé pšenici preemergentně do 5 dnů po zasetí na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud nebo postemergentně od 3. listu pšenice (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29). Výsev ozimé pšenice je třeba provést stejnoměrně na hloubku 3 cm.

Maximální počet aplikací v plodině: 1× na podzim nebo na jaře.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
Ovocné školky	plevele dvouděložné jednoleté	1,5–3 l/ha, 200–400 l vody/ha	-	od: na vzešlé plevle, max. 1×, v průběhu května až do konce června

OL = ochranná lhůta. Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.

Upozornění: Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Praktické možnosti aplikace

Tolurex® 50 SC se aplikuje v ozimé pšenici preemergentně do 2 dnů po zasetí pšenice na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud. Výsev ozimé pšenice je třeba provést stejnoměrně na hloubku 3 cm.

Postemergentní aplikace se provádí od 2. listu obilniny do konce odnožování. Tank mix partnerem na podzim bývá většinou herbicid na bázi sulfonylmočoviny. Na jaře pak široká paleta herbicidů, viz tabulka.

Dávkování přípravku Tolurex® 50 SC dle velikosti chundelky:

1–2 listy	1,3–1,5 l/ha
3–5 listů	2–2,5 l/ha
5 a více listů	3 l/ha



Jednoduché ekonomické řešení nabízí tento tank mix: **Tolurex® 50 SC 1,5–2 l/ha + Legato® 500 SC 0,15 l/ha.**

Na žádost firmy Adama bylo provedeno v ZVÚ Kroměříž testování eventuální citlivosti současných nejpěstovanějších odrůd pšenice na chlorotoluron. Ani při dvojnásobném předávkování nebyly zjištěny u žádné z 24 testovaných odrůd jakékoliv známky fytoxicity.