

Cuprosan

Foliar

Fertilizante foliar en base a Cobre complejoado con extracto de alga *Ascophyllum nodosum* y otros compuestos orgánicos tales como aminoácidos, ácidos orgánicos y polialcoholes.

Ingrediente Activo:

Sulfato de Cobre Pentahidratado:22,4% p/v

5 lt. CONTENIDO NETO

Distribuido por:

ADAMA Chile S.A.

Camino Catemito 2800, Calera de Tango, Santiago, Chile. Fono: +56 2 2855 0048



ADVERTENCIAS PARA APLICACIÓN: Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, excepto aceites y productos de reacción alcalina. Dado esto, y a la gran variabilidad de formulaciones existentes, es recomendable hacer una mezcla previa a escala. Por lo anterior, se recomienda hacer una pequeña prueba de campo antes de la aplicación.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43°C. Evitar el congelamiento.

PRECAUCIONES: Aunque este producto es natural, es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No comer o beber durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales, en cuyo caso inducir el vómito. Nunca dar a beber ni inducir el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación por lo cual se recomienda lavar con abundante agua. No almacenar en casas de habitación. Mantener alejado de niños, animales domésticos y alimentos. Es recomendable manipularlo con overol y anteojos. En caso de ingesta, dar tratamiento sintomático. Destruir el envase después de usar el producto.

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. Diluir con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Cuprosan puede ser aplicado vía aérea o terrestre.

DOSIS DE APLICACIÓN: Cultivos frutales y hortalizas: Aplicar 1-1,5 lt/ha con la aparición de los primeros síntomas de deficiencia o dependiendo del requerimiento del cultivo. Para mayor información seguir indicaciones de la Ficha Técnica del producto.

CONDICIONES DE VENTA, LIMITACIONES DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES: Leer todas las instrucciones de uso, condiciones de venta, limitaciones de garantía y obligaciones antes de comprar o utilizar el producto. Si estos términos no son aceptados, devolver el producto y precio de venta será devuelto.

GARANTÍA: Tanto el fabricante como el distribuidor garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado.

El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

Metales pesados:

Plomo	<3 ppm
Mercurio	<3 ppm
Arsénico	<3 ppm
Cadmio	<3 ppm

Análisis Garantizado:

Carbono Orgánico:	9,6%
Densidad a 20°C	1,12 g/cc
pH al 0,1%	4,2
Solubilidad en agua a 20°C:	95%

Cuprosan

Foliar

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS LT/HA
UVA DE MESA Y VINÍFERA	Iniciar la aplicación con brotes de 3 a 4 hojas, repitiendo hasta flor. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	2
	Aplicar desde la pinta hasta la pre-cosecha. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
DURAZNOS, NECTARINOS, DAMASCOS, CIRUELOS, CEREZOS, ALMENDROS	Aplicar en otoño previo y durante caída de hojas 1 a 4 veces, yema hinchada: 1 a 4 veces y poda de limpieza: 1 a 4 veces. 1 a 4 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
PERALES	Aplicar cuando se observen las primeras flores, repitiendo en plena flor. 2 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
MANZANOS	Efectuar las aplicaciones en otoño, durante la caída de hojas. 1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
CÍTRICOS Y PALTOS	Aplicaciones otoñales, especialmente después de lluvias. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
NOGAL, AVELLANO EUROPEO, ALMENDRO, OLIVO	Aplicar desde floración hasta fruto cuajado, repetir cada 7 días. Mojamiento 1500 -2000 L agua/ha.	1,50 - 2,00
PAPAS	Desde 15 a 20 cm de altura de planta, repetir cada 10 a 12 días. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
FRUTILLAS, FRAMBUESOS, ARÁNDANOS	1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días.	0,75 - 1,25
TOMATES, PIMENTONES, LECHUGAS, REPOLLO, COLIFLOR, BRÓCOLI	Aplicar con la aparición de los primeros síntomas y repetir 10 días después con un máximo de 5 aplicaciones por temporada.	0,75 - 1,5
KIWI	Realizar 1 a 2 aplicaciones durante precaída de hojas, caída de hojas y en yema hinchada. Realizar 1 a 2 aplicaciones desde periodo de brotación hasta floración. Máximo 4 aplicaciones durante la temporada.	0,75 - 1,5

Cuprosan puede ser aplicado vía aérea o terrestre.

DATAMATRIX 5X2 CM