



SucraMax[®]

Bioestimulante para Aumentar Grados Brix



Bioestimulante

Análisis Garantizado

Carbono Orgánico Oxidable Total	7,63 %p/v	(76,3 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 %p/v	(1L)

Solubilidad en agua: 100%, a 20 °C

pH: 6,5

Densidad: 1070 g/L, a 20 °C

Fecha de Caducidad: 3 años después de su fecha de fabricación.

Contenido:

10 L



GTIN

Fecha Formulación

No. de Lote

Importado y Distribuido por:



Adama Chile S.A

Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II,
Of. 1602, Las Condes, Santiago, Chile.
Tel.: 562 28550048
www.adama.com/chile/es



Fabricado por:



Innovak Global, S.A. de C.V.

Blvd. Vicente Lombardo Toledano #6615

Col. Concordia Chihuahua, Chih. México C.P. 31375

Tel. (614) 436-0138 Fax (614) 415-4770

www.innovakglobal.com

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Lea cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. Use el equipo de protección adecuado y completo: overol o camisa de manga larga y pantalón, mascarilla para polvos, lentes industriales, guantes y botas de hule. Después de una jornada de trabajo, báñese y use ropa limpia.

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”.

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de ingestión accidental: Enjuague la boca con abundante agua y suministre un álcali débil (bicarbonato de sodio).

En caso de contacto cutáneo: Quite toda la ropa contaminada. Ponga la piel en contacto con agua corriente (ducha o manguera) en abundancia. Lave el área afectada con agua corriente y jabón, seque perfectamente la piel y póngase ropa limpia.

En caso de contacto ocular con el producto: Mantenga los párpados abiertos e inmediatamente lave el ojo con una corriente moderada de agua. Continúe lavando cuando menos por 15 minutos, si la irritación persiste consulte a su oftalmólogo.

“MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“NO VIERTA EL AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

Metales Pesados	Menor a: (ppm)
Arsénico (As)	2,0
Cadmio (Cd)	2,5
Mercurio (Hg)	4,0
Plomo (Pb)	3,3

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

Sucramax® es un bioestimulante para aumentar los grados brix debido a que estimula la translocación y almacenamiento de fotosintatos en los frutos.

USO:

Aspersión foliar. Agite el envase, desenrosque la tapa y retire el sello de seguridad; mida la cantidad a aplicar en probeta o recipiente graduado y vierta en cubeta para premezcla, diluya completamente y finalmente vierta en el tanque de la aspersora conteniendo la mitad del volumen de agua, agite y complete el total del volumen de aspersión. Diluyase en suficiente volumen de agua para asegurar un buen cubrimiento. Se sugiere emplear aditivos de aspersión, recomendados para este tipo de aplicaciones foliares.

CULTIVO	DOSIS L/ha	No. DE APLICACIONES	CONCENTRACIÓN (cc/100 L de agua)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Vides de mesa	2-3	1	200	*Por aspersión foliar dirigida a hoja y racimo *En el momento en que el racimo pase el 70% de envero, a intervalo semanal.
Tomates, Aji Pimientos	2-3	1	200	*Por aspersión foliar dirigida a hoja y fruto *En el momento en que los frutos presenten el 70% de maduración.
Cucurbitáceas				

INCOMPATIBILIDAD:

Siempre realice una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

GARANTÍA: Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la composición y contenido publicada en esta etiqueta siempre y cuando el producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado y el envase de este producto cuente con su sello de seguridad, haya sido almacenado apropiadamente y se utilice antes de su fecha de expiración. Innovak Global, S.A. de C.V. garantiza la efectividad del producto siempre y cuando se sigan al pie de la letra las indicaciones de uso contenidas en esta etiqueta. Dado que el manejo, transporte, dosificación y aplicación de los productos están fuera de su control, Innovak Global, S.A. de C.V. no se hace responsable por efectos inesperados obtenidos como consecuencia del mal uso, dosificación equivocada, manejo errado o uso de productos expirados o mal conservados.

