



# Ficha Técnica Herbicidas

## Afalon® 50 SC

Herbicida suspensión concentrada (SC)

### Principales características

**Afalon® 50 SC**, es un herbicida sistémico y selectivo, el cual penetra a las malezas a través de hojas y raíces actuando en la zona de germinación de las malezas, durante 1 hasta 4 meses de acuerdo a la dosis aplicada, textura y materia orgánica del suelo. Las malezas controladas por **Afalon® 50 SC**, se indican en el cuadro de instrucciones de uso del producto.

### Ingrediente Activo

Linuron

### Composición

Linuron\* ..... 50 % p/v  
(500 g/L)

Coformulantes ..... 100 % p/v  
(1 L)

\*3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-metilurea

Cultivos	Malezas	Dosis (L/há)	Observaciones
<b>Aplicación aérea</b>			
Trigo primavera	Alfilerillo, bleado, cebadilla, duraznillo, hualcacho, linacilla, llantén, malvilla, mastuerzo, mostaza, ñilhue, ortiga, pasto blanco, pata de gallina, pega-pega, pichoga, piojillo, quilloy-quilloy, quinguilla, rábano, romaza, verdolaga, vinagrillo, yuyo, paco yuyo, ambrosia, falaris, tomatillo, sanguinaria, bolsita de pastor, ballica anual, manzanilla.	1,5 - 2,0	Efectuar una sola aplicación en pre-emergencia, aplicar con 2 a 4 días después de la siembra, con un mojaniento de 40 L/há de agua.

# Afalon® 50 SC

Cultivos	Malezas	Dosis (L/há)	Observaciones
Ajo	Alfilerillo Bledo Cebadilla Duraznillo	1,2 - 1,5	Aplicar en post-emergencia a malezas de 2 a 4 hojas y ajos de 10 cms., de altura, aplicar en lo posible después de una lluvia o un riego. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Apio	Hualcacho Linacilla LLantén Malvilla	1,5 - 2,5	Aplicar después de un riego, 10 a 20 días después de plantar y dependiendo de las condiciones climáticas y el grado de infección de las malezas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Arveja	Mastuerzo Mostaza Ñilhue	1,0 - 2,0	Efectuar una sola aplicación después de la siembra, en pre-emergencia. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Cebolla	Ortiga Pasto blanco Pata de gallina Pega-pega Pichoga	0,8 - 1,0	Aplicar 10 a 20 días después de la siembra y después de un riego de manera muy uniforme. Aplicar enseguida después de un riego de manera muy uniforme y dependiendo de las condiciones climáticas y el grado de infección de las malezas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Cebada	Piojillo Quilloy-quilloy Quinguilla	1,5 - 2,0	En pre emergencia aplicar inmediatamente después de la siembra. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
	Rábano Romaza Verdolaga	1,0 - 1,5	En post emergencia, aplicar en plantas con 3 a 4 hojas, antes de la macolla. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Espárragos	Vinagrillo Paco yuyo	1,5 - 2,0	Aplicar en pre-emergencia a partir del 3er año de plantación. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Maravilla	Ambrosia Falaris tomatillo Sanguinaria	2,0 - 3,0	Aplicar en pre-emergencia, usando dosis mínimas en suelos livianos y las máximas en suelos pesados. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Gladiolos	Bolsita del pastor Ballica anual	1,0 - 1,5	Aplicar inmediatamente antes de la emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Habas	Manzanilla	1,0 - 2,0	Aplicar un día después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Lentejas		1,0 - 1,5	Aplicar un día después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Lupino		2,0 - 2,5	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Manzano, peral, membrillo, kiwi, duraznero, nectarino, damasco, ciruelo, cerezo, almendro, nogal, vides		5,0 - 6,0	Aplicar el producto a partir del 3er año de plantación, con pulverización dirigida después de desmalezar mecánicamente en Agosto - Septiembre. Efectuar una sola aplicación en la temporada. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Papas		1,5 - 3,0	Aplicar en emergencia después de la siembra, aporcar y aplicar alrededor de 5 días antes que emerjan. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Perejil, cilantro		1,0 - 2,0	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Porotos		1,0 - 2,0	Aplicar inmediatamente después de la siembra en pre-emergencia. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Trigo primavera (no asociado)		1,5 - 2,0	Efectuar una sola aplicación en pre-emergencia, Aplicar 2 a 4 días después de la siembra. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
		1,0 - 1,2	En pre-emergencia, aplicar cuando las plantas tengan 3 a 6 hojas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
Zanahoria		2,0 - 3,0	En pre-emergencia, aplicar después de la siembra y un riego. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.
		1,5 - 2,5	En post-emergencia, aplicar con 3 hojas verdaderas. Efectuar una sola aplicación. Mojamiento: 200 a 250 L/há.



# Afalon® 50 SC

## Nota

La dosis mínima se comprende para suelo livianos arenosos y la máxima para suelos pesados arcillosos. No aplicar en suelos arenosos con menos de 1 % de materia orgánica. Deben evitarse dosis excesivas o repeticiones en el sector aplicado.

Es esencial que el suelo esté húmedo al momento de la aplicación. Después de la aplicación y mientras no aparezcan malezas, evitar mover el suelo con trabajos culturales, para no destruir la capa de **Afalon® 50 SC** en la superficie tratada, lo cual disminuirá el efecto residual del herbicida.

## Preparación de la mezcla

Hacer pre-mezcla de la dosis indicada de **Afalon® 50 SC** en un balde de agua y agitar, vierta la pre-mezcla al estanque con agua hasta la mitad, manteniendo el agitador en marcha, luego agregar el agua faltante.

## Fitotoxicidad

**Afalon® 50 SC** no presenta toxicidad a los cultivos indicados si se utiliza siguiendo estrictamente las instrucciones de esta etiqueta.

Puede existir sensibilidad varietal para los distintos cultivos, por lo que se recomienda realizar pruebas previas en caso de dudas.

## Período de carencia (días)

Por su época de uso no corresponde.

## Tiempo de reingreso

No reingresar al área tratada antes de 4 horas de aplicado el producto. El periodo de resguardo de 30 días para el reingreso de animales a los sectores tratados.

## Compatibilidad

**Afalon® 50 SC** es compatible en mezcla de estanque con otros herbicidas, como por ejemplo: Atrazina y 2,4-D.

**Afalon® 50 SC**, es incompatible con productos fuertemente alcalinos. No se recomienda mezclar con fungicidas o insecticidas.

FABRICANTE/FORMULADOR  
**ADAMA AGAN LTD. - ISRAEL**

DISTRIBUIDOR EN CHILE  
**ADAMA Chile S.A.**