HERBICIDA

ADAMA

Ficha Técnica Herbicidas Goltix Compact® 90% WG

Herbicida granulado dispersable (WG)

Principales características

Goltix Compact® 90% WG, es un herbicida altamente selectivo para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de la Remolacha azucarera, de acuerdo a lo indicado en el cuadro de instrucciones. **Goltix Compact® 90% WG** puede ser aplicado en pre-siembra incorporado, pre-emergencia y en post-emergencia.

Controla también un amplio espectro de malezas anuales, las cuales se indican el cuadro de instrucción en pre y post-emergencia en cultivos de remolacha, acelga, espinaca y betarraga.

Ingrediente Activo

Metamitrona

Composición

Metamitrona* ..... 91% p/p (910g/kg)
Coformulantes, c.s.p. ... 100% p/p (1 kg)
*4 amino-4,5-dihidro-3-metil-6 fenil-1,2,4-triazin-5-ona

Cultivos	Malezas	Dosis (Kg/há)	Observaciones
Remolacha azucarera, acelga, espinaca, betarraga	**Muy susceptibles:** manzanillón, bolsita del pastor, quingüilla, fumaria, ortiga, verónica, manzanilla, bledo, tomatillo, malva, quilloi.quilloi, viola. **Moderadamente susceptibles:** sanguinaria, enredadera, correhuela. **Poco susceptibles:** gramíneas hualcacho, piojillo, rábano, yuyo, mostaza.	2,5	Aplicar en pre-emergencia y postemergencia del cultivo y de la maleza, con mojamientos no mayores a 200 litros/há. También se puede realizar una aplicación de pre-siembra incorporando el producto en el suelo. Realizar 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 20-25 días. En aplicaciones en banda se debe reducir la dosis, proporcionalmente según el área efectivamente tratada. En siembras de otoño se pueden realizar aplicaciones aéreas con un volumen de aplicación de 40 L/há.

HERBICIDA

Karmex® 80 WG

Nota 1
No se recomiendan aplicaciones de pre siembra en los cultivos de remolacha azucarera, betarraga, acelga y espinaca por la modalidad de preparación de suelo utilizada para la producción del cultivo.

Nota
Para una aplicación segura y eficaz del producto no aplicar con viento, no aplicar con altas T° (mayores a 28°C), dirigir las aplicaciones al suelo y no trabajar en la niebla la solución pulverizada.

Preparación de la mezcla
Agregar la cantidad de **Goltix Compact® 90% WG** al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua manteniendo la agitación.

Fitotoxicidad
Goltix Compact® 90% WG no presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las recomendaciones adecuadamente.

Periodo de c arencia
90 días (remolacha azucarera). En acelga, espinaca y betarraga no corresponde debido al tipo y momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al área tratada
El tiempo de reingreso como también el periodo de resguardo para el ingreso de personas y animales es de 4 horas mínimo. Se recomienda reingresar al área tratada sólo después que la aplicación del producto se haya secado completamente en el follaje después de realizada la aplicación.

Incompatibilidad
Goltix Compact® 90% WG no debe mezclarse con productos de reacción alcalina. Una vez preparado el producto en agua, aplíquelo el mismo día.

Compatibilidad
Goltix Compact® 90% WG es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso agrícola. Generalmente se mezcla con Phenmediphan y Ethofumesate; también con algunos graminicidas tales como Quizalofop-etil, Propaquizafop, Fluazifop-p-butil, Clethodim, Setoxydim. En todos los casos, dado que los coadyuvantes pueden afectar la compatibilidad de las formulaciones, se deben ensayar mezclas antes de usarlas.

FABRICANTE/FORMULADOR
ADAMA AGAN LTD. - ISRAEL

DISTRIBUIDOR EN CHILE
ADAMA Chile S.A.