



Ficha Técnica Herbicidas

Karmex[®] 80 WG

Herbicida granulado dispersable (WG)

Principales características

Karmex[®] 80 WG, es un herbicida selectivo, de acción residual que actúa inhibiendo la fotosíntesis de las malezas sensibles y que debe ser aplicado al suelo bien preparado, con buena humedad, mullido y antes de que las malezas emerjan. Es absorbido por las raíces de las malezas en activo crecimiento. El suelo, una vez aplicado no debe moverse.

Karmex[®] 80 WG, controla malezas anuales: quinguilla, bleado, verdolaga, ambrosia, pata de gallina, hualcacho, capulli, quillo-y-quillo, linacilla, bolsita de pastor, enredadera, cerastio, piojillo, pasto oloroso, pega-pega, cola de ratón, pasto miel, yuyo, duraznillo anual, ñilhue anual, falsa achicoria, manzanilla, rábano y sanguinaria.

Ingrediente Activo

Diuron

Composición

Diuron*80%
p/p (800 g/kg)
Coformulantes, c.s.p. 100%
p/p (1 kg)
*3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

Karmex® 80 WG

Cultivos	Malezas	Dosis (Kg/há)	Observaciones
Alcachofa	Quingüilla, bledo, verdolaga, ambrosia, pata de gallina, hualcacho, capulí, quilloy-quilloy, linacilla, bolsita del pastor, enredadera, cerastio, piojillo, pasto oloroso, pega-pega, cola de ratón, pasto miel, yuyo, duraznillo anual, ñilhue anual, falsa achicoria, manzanilla, rábano y sanguinaria.	2 a 4	Otoño o inicios de invierno, sobre suelo mullido, húmedo y bien preparado. Dirigir la aplicación para cubrir el área entre las hileras y en la base de las plantas, evitando mojar el follaje del cultivo.
Alfalfa		2 a 3	Solo aplicar en alfalfa establecida de más de un año. En invierno, con alfalfa en latencia, después de un corte.
Avena, cebada, trigo		1 a 1,5	Inmediatamente después de la siembra en cultivos de invierno. No sembrar ningún otro cultivo dentro de un año después de la última aplicación (excepto los indicados).
Espárragos		2 a 4	No aplicar en espárragos recién establecidos de semillas, o en plantas con raíces expuestas. En esparragueras nuevas trasplantadas, aplicar 3 a 4 kg/ha en suelos arcillosos o con alto contenido de materia orgánica, sobre suelo libre de malezas, mullido y húmedo. No aplicar en suelos con menos del 2% de materia orgánica, o cuando la planta trasplantada ha quedado a una profundidad menor a 5 cms. En plantaciones establecidas, en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica, aplicar alrededor de un mes antes que aparezcan los primeros espárragos, sobre suelo limpio, mullido y húmedo. Una segunda aplicación puede realizarse inmediatamente después de la cosecha, sobre suelo libre de malezas y húmedo. Regar si no llueve dentro de las dos semanas siguientes a la aplicación.
Festuca, pasto ovillo		1 a 2	Durante el receso vegetativo en otoño-invierno, para el control de malezas anuales y plántulas de resiembra en semilleros de más de un año.
Gladiolo		1 a 2	Sobre suelo húmedo y libre de malezas.
Cítricos (limoneros, naranjos, mandarinos y pomelos), manzanos, perales y nogales		3 a 5	En árboles de más de un año de plantados. Usar las menores dosis en suelos livianos.
Durazneros, ciruelos, nectarinos, damascos		3 a 5	En árboles de más de 3 años de plantados.
Viñedos, parronales		3 a 4	En parras de más de 3 años de plantadas. No usar en suelos con menos de 2% de materia orgánica, ni en plantas con diámetro de tronco menor a 4 cm, con raíces expuestas.
Kiwi, almendro, cerezo, palto	3 a 5	Aplicar en otoño-invierno, en árboles de más de 3 años de plantación. No se recomienda en suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica (< 2%). Aplicar con un volumen de agua de 150 a 250 L/ha. Realizar 1 aplicación por temporada. Requiere ser incorporado con agua, proveniente de las lluvias.	
Drenes, canales de regadío		10 a 20	Otoño-Invierno, cuando el canal no esté en uso, después de una limpia.



Karmex[®] 80 WG

Nota

Emplear las dosis menores en suelos livianos y las mayores en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica.

En cultivos, no aplicar en suelos arenosos o con menos de 1% de materia orgánica, ni en viñedos, parronales y espárragos cuyos suelos tengan menos de 2% de materia orgánica.

Aplicar siempre en suelos bien preparados, mullidos, sin terrones, sin malezas presentes y con buena humedad o donde se esperen lluvias o riego artificial antes de 2 semanas después de realizada la aplicación de **Karmex[®] 80 WG**.

No se recomienda hacer más de una aplicación de **Karmex[®] 80 WG** al año por cultivo, a no ser que se indique lo contrario.

Volumen de agua

Tilizar un mojamiento de 200 lt/ha.

Preparación de la mezcla

Medir la cantidad necesaria de **Karmex[®] 80 WG**, adicione ésta directamente al estanque aplicador a medio llenar o bien previamente disuelto en agua y con el agitador funcionando, por ultimo terminar de llenar el tanque de agua.

Fitotoxicidad

Karmex[®] 80 WG usado en los cultivos indicados y de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta no es fitotóxico al cultivo.

Periodo de carencia

Durazneros, ciruelos 60 días;
cebada, avena, trigo, festuca, pasto ovillo 60 días;
alcachofa, alfalfa y espárragos 30 días;
cítricos, manzanos, perales, damascos, viñedos, parronales, nogales y nectarines 60 días;
gladiolos no corresponderá días de carencia. Debido a su época de uso, siempre se cumplirán los días de carencia establecidos en esta etiqueta.

Tiempo de reingreso

Se recomienda esperar al menos 4 horas. Para animales, no corresponde considerar un tiempo de reingreso.

Incompatibilidad

Karmex[®] 80 WG no posee incompatibilidades conocidas.

Compatibilidad

Karmex[®] 80 WG es compatible con los principales herbicidas usados habitualmente en estos cultivos. Cuando en una misma zona se usan repetidamente herbicidas de un mismo modo de acción, podrá producirse la aparición de biotipos de malezas resistentes las cuales podrán propagarse y dominar en la zona. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomienda prácticas culturales de rotación, prevenir los escapes e impedir que estos semillen, usar herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos de rotación.

FABRICANTE/FORMULADOR

MAKHTESHIM AGAN OF NORTH AMERICA - ESTADOS UNIDOS

DUPONT DE COLOMBIA S.A. - COLOMBIA

DUPONT DO BRASIL LTDA. - RJ, BRASIL

DISTRIBUIDOR EN CHILE

ADAMA Chile S.A.