

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Diazinon, ingrediente activo de **DIAZOL® 50 EW**, pertenece al grupo químico de los Organofosfatos. Durante la preparación del concentrado líquido usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar traje protector impermeable, máscara con filtro, antiparras guantes impermeables y botas de goma. No permitir el ingreso ni la manipulación del producto por terceras personas en áreas que están siendo sometidas a tratamientos. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada, ni en agua de riego o consumo. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto. **Síntomas de Intoxicación:** Los síntomas de envenenamiento suelen aparecer entre las primeras 24 horas después de la exposición, manifestándose con síntomas como: Dolor de cabeza, mareos, náuseas, dolor de pecho, ansiedad, pesadillas, flujo excesivo de lágrimas, diarreas, calambres, taquicardia, bradicardia, transpiración excesiva, rigidez tóraxica y convulsiones. **Contraindicaciones:** Si se presentan convulsiones y no existe depresión respiratoria, inyectar diazepam por vía intravenosa (0,1 mg/kg). NO usar Atropina en pacientes cianóticos, puede producir fibrilación ventricular. NO administrar opiáceos o barbitúricos. **Tratamiento médico de emergencia:** Se sugiere suero y/o determinación RBC colinesterasa. Realizar lavado gástrico y administrar carbón activado. **Primeros Auxilios: En caso de contacto cutáneo,** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y jabón la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto ocular,** lavar los ojos con abundante agua fría y corriente durante 15 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Procurar asistencia médica en caso de complicaciones. **En caso de inhalación,** trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **En caso de ingestión,** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Antídoto:** Tratamiento 1: Sulfato de Atropina. Tratamiento 2: Obidóxima (Toxogonin) ó Pralidoxima. **Ecotoxicidad:** DIAZOL® 50 EW es extremadamente tóxico para peces y aves. **MUY TÓXICO PARA ABEJAS. DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE LA APLICACIÓN. APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES. INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE. PARA APLICACIONES AÉREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA. **Instrucciones de Triple Lavado:** Para realizar triple lavado de envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces. Conservar este producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos y perforados, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad competente.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 22635 3800, Santiago, Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es 22855 0048 Adama Chile S.A., Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: El producto durante su fabricación ha sido sometido a estrictos controles de calidad, por tanto, garantizamos el porcentaje de Ingrediente Activo de los envases debidamente sellados. Como el almacenamiento y la aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

DIAZOL® 50 EW

INSECTICIDA EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

DIAZOL® 50 EW es un insecticida que actúa en el control de los insectos, de acuerdo a las indicaciones entregadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

*Diazinon..... 50% p/v (500 g/L)
 Cofomulantes, c.s.p..... 100% p/v (1 L)
 *fosforotioato de *O, O*-dietilo y de *O-2*-isopropil-6-metilpirimidin-4-ilo.

Lote Nº: Ver envase
Fecha Vencimiento: Ver envase

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 1591

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: L.

Fabricado por:
Adama Makhteshim Ltd.
 P.O. BOX 60 Beer-Sheva 84100 Israel

Lion Agrevo (Jiangsu) Co., Ltd.
 N°16, Second Haibin Road, Chemical Industrial Park, Yangkou Coastal Economic Development Zone, Rudong County, Jiangsu, China

Anhui Jintal Pesticides Chemical Co., Ltd.
 Qingquan Road, Hefei Circular Economy Demonstration Park, Feidong County, Hefei City, Anhui Province, China

Importado y Distribuido en Chile por:
Adama Chile S.A.
 Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II, Of. 1602, Las Condes, Santiago - Chile



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

DIAZOL® 50 EW es un insecticida organofosforado con acción de contacto, ingestión e inhalación. Controla un amplio espectro de insectos picadores-chupadores y masticadores en diversos cultivos de acuerdo al Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN TERRESTRE

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS		OBSERVACIONES
		cc/100 L de agua	L/ha	
Manzanos, Perales, Membrilleros	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Polilla oriental (<i>Cydia molesta</i>), Escama de San José (<i>Diaspodiotus perniciosus</i>), Pulgón lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	90 - 100		Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas, gusano de los penachos y pulgones. Para control de escama de San José y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de larvas o ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 2.000-2.500 L de agua ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas.
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>) Pulgón lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>)	100 - 140	Mínimo 2,5 - 3,5	Mojamiento 2.500 L de agua/ha
Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Guindo, Damasco, Almendro	Polilla oriental (<i>Cydia molesta</i>), Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Escama de San José (<i>Diaspodiotus perniciosus</i>), Escama blanca (<i>Aspidiotus nerii</i>), Conchuelas café (<i>Parthenolecanium persicae</i>), Conchuela café europea (<i>Parthenolecanium corni</i>), Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>), Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>)	90 - 100		Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas, trips y pulgones. Para control de conchuelas, escamas y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de larvas o ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 1.500-2.000 L de agua/ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas.
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>) Burrillo de la vid (<i>Naupactus xanthographus</i>), Capachito de los frutales (<i>Aegorhinus superciliosus</i>)	100 - 140	Mínimo 2,0 - 2,8	Mojamiento 2.000 L de agua/ha
Durazneros, nectarines, pluot o plumcot, cinuelos, damascos, cerezos	Burrillo de la vid (<i>Naupactus xanthographus</i>), Capachito de los frutales (<i>Aegorhinus superciliosus</i>)		3 - 6	Aplicación vía riego: Primera aplicación: inicio desarrollo frutos, Segunda aplicación: postcosecha Aplicar de acuerdo al monitoreo de los insectos en el suelo y base de las plantas, de preferencia a inicios de primavera y mediados de verano. Utilizar dosis menor de 3L/ha con volumen de agua de 1000-2500 L agua/ha. Determinar volumen de agua a utilizar de acuerdo al historial del huerto y profundidad de raíces. Dosis de 4-6 L/ha con volumen de agua superior a 3000 L agua/ha. Utilizar dosis mayor cuando las colonias se encuentren a mayor profundidad.
Nogal	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Polilla del nogal (<i>Ectomyelois ceratoniae</i>)	90 - 100	Mínimo 2,0 - 2,8	Aplicación vía riego: Primera aplicación: inicio desarrollo frutos, Segunda aplicación: postcosecha Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 2.000-2.500 L de agua/ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas.
Avellano Europeo	Larvas de Capachito (<i>Asynonychus cervinus</i> (Boheman)), Burrillo de la Vid (<i>Naupactus xanthographus</i>)		2	Dos aplicaciones por temporada con intervalo de 21 días, vía drenching, dirigido al cuello y base de las plantas. Aplicar en el peak de desarrollo de las larvas. Mojamiento: 1.000 L agua ha. En huertos de alta densidad o árboles de mayor edad que requieran mayor volumen de agua para lograr la cobertura de la base, se debe respetar una concentración mínima de 0,2% de producto cada 100 L de solución.
Uvas (Vides viníferas y Uva de mesa)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Eulias (<i>Proeuila auraria</i> , <i>Proeuila triquetra</i> , <i>Proeuila crysopteris</i>)	80 - 100		Comenzar las aplicaciones de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de eulias y trips. Para chanchito blanco comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de ninfas. Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días, utilizando un volumen de aplicación de 1.000 1.500 L de agua/ha. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión.
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>), <i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>Pseudococcus longispinus</i>) Burrillo de la Vid (<i>Naupactus xanthographus</i>)	140 - 150	Mínimo 2,1 - 2,25	3 - 6
Naranja, Limonero, Mandarino, Clementino, Pomelo, Tangelo	Chanchito Blanco (<i>Planococcus citri</i>), Conchuela blanca acanalada (<i>Icerya purchasi</i>), Conchuela negra (<i>Saissetia oleae</i>), Escama morada de los cítricos (<i>Lepidosaphes beckii</i>), Escama Roja (<i>Aonidiella aurantii</i>), Mosquita blanca (<i>Aleurothrixus floccosus</i>), Pulgones (<i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>), Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>), Eulias (<i>Proeuila auraria</i> , <i>Proeuila triquetra</i> , <i>Proeuila crysopteris</i>)	80 - 100		Comenzar las aplicaciones de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de eulias y trips. Para chanchito blanco, conchuelas y escamas, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de ninfas. Realizar 1 aplicación por temporada, utilizando un volumen de aplicación de 4.000-5.000 L de agua/ha. Suspender los tratamientos antes de la cosecha según el período de carencia recomendado. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión.
Remolacha Azucarera	Cuncunilla verde (<i>Rachiplusia nu</i>), Langostino de la remolacha (<i>Paratanus exitiosus</i>), Minahojas (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), Pulgones (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga. Utilizar un volumen de aplicación de 400 a 600 L de agua ha.
Alcachofa, Coliflor, Brócoli, Repollo de Bruselas, Repollo, Zanahoria	Cuncunillas (<i>Copitarsia consuetata</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Trichoplusia ni</i>), Langostino (<i>Paratanus exitiosus</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Polilla del Repollo (<i>Plutella xylostella</i>), Pulgones (<i>Nasonovia ribisnigris</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Aphis craccivora</i> , <i>Capitophorus eleagni</i>), Trips (<i>Thrips tabaci</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga. Utilizar un volumen de aplicación de 400 a 600 L de agua/ha.
Frutillas	Pulgones (<i>Chaetosiphon thomasi</i> , <i>Chaetosiphon fregaeolii</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis craccivora</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga. Utilizar un volumen de aplicación de 400 a 600 L de solución.
Arándanos	Larvas de Capachito (<i>Asynonychus cervinus</i>), Gorgojo de la Frutilla (<i>Otiorynchus sulcatus</i>)		2	Dos aplicaciones por temporada con intervalo de 21 días, vía drenching, dirigido al cuello y base de las plantas. Aplicar en el peak de desarrollo de las larvas. Mojamiento: 1.000 L agua ha. En huertos de alta densidad o mayor grosor de tronco, se debe respetar una concentración mínima de 0,2% de producto cada 100 L de solución.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIÓN AÉREA

Manzanos, Perales, Membrilleros	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Polilla oriental (<i>Cydia molesta</i>), Escama de San José (<i>Diaspodiotus perniciosus</i>), Pulgón lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	90 - 100		Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas, gusano de los penachos y pulgones. Para control de escama de San José y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de larvas o ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15 - 60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor.
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>)	100 - 140	Mínimo 2,5 - 3,5	Utilizar un mojamiento de 15 - 60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor.
Duraznero, Nectarino, Ciruelo, Cerezo, Guindo, Damasco, Almendro	Polilla oriental (<i>Cydia molesta</i>), Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Escama de San José (<i>Diaspodiotus perniciosus</i>), Escama blanca (<i>Aspidiotus nerii</i>), Conchuelas café (<i>Parthenolecanium persicae</i>), Conchuela café europea (<i>Parthenolecanium corni</i>), Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>), Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>)	90 - 100		Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas, trips y pulgones. Para control de conchuelas, escamas y chanchito blanco, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de larvas o ninfas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15 - 60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas.
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>)	100 - 140	Mínimo 2,0 - 2,8	Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor.
Nogal	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>), Polilla del nogal (<i>Ectomyelois ceratoniae</i>)	90 - 100	Mínimo 2,0 - 2,8	Aplicar de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de polillas. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15 - 60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión de plagas.
Uvas (Vides viníferas y Uva de mesa)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>), Eulias (<i>Proeuila auraria</i> , <i>Proeuila triquetra</i> , <i>Proeuila crysopteris</i>)	80 - 100		Comenzar las aplicaciones de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de eulias y trips. Para chanchito blanco comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de ninfas. Realizar hasta 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión
	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i>), <i>Pseudococcus calceolariae</i> , <i>Pseudococcus longispinus</i>)	140 - 150	Mínimo 2,1 - 2,25	Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor.
Naranja, Limonero, Mandarino, Clementino, Pomelo, Tangelo	Chanchito Blanco (<i>Planococcus citri</i>), Conchuela blanca acanalada (<i>Icerya purchasi</i>), Conchuela negra (<i>Saissetia oleae</i>), Escama morada de los cítricos (<i>Lepidosaphes beckii</i>), Escama Roja (<i>Aonidiella aurantii</i>), Mosquita blanca (<i>Aleurothrixus floccosus</i>), Pulgones (<i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i>), Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>), Eulias (<i>Proeuila auraria</i> , <i>Proeuila triquetra</i> , <i>Proeuila crysopteris</i>)	80 - 100		Comenzar las aplicaciones de acuerdo a monitoreo de la plaga para el control de eulias y trips. Para chanchito blanco, conchuelas y escamas, comenzar las aplicaciones cuando se observen las primeras migraciones de ninfas. Realizar 1 aplicación por temporada. Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Suspender los tratamientos antes de la cosecha según el período de carencia recomendado. Utilizar dosis máxima en condiciones de alta presión.
Remolacha azucarera	Cuncunilla verde (<i>Rachiplusia nu</i>), Langostino de la remolacha (<i>Paratanus exitiosus</i>), Minahojas (<i>Liriomyza huidobrensis</i>), Pulgones (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga.
Alcachofa, Coliflor, Brócoli, Repollo de Bruselas, Repollo, Zanahoria	Cuncunillas (<i>Copitarsia consuetata</i> , <i>Copitarsia turbata</i> , <i>Rachiplusia nu</i> , <i>Trichoplusia ni</i>), Langostino (<i>Paratanus exitiosus</i>), Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Polilla del Repollo (<i>Plutella xylostella</i>), Pulgones (<i>Nasonovia ribisnigris</i> , <i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Cavariella aegopodi</i> , <i>Aphis craccivora</i> , <i>Capitophorus eleagni</i>), Trips (<i>Thrips tabaci</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga.
Frutillas	Pulgones (<i>Chaetosiphon thomasi</i> , <i>Chaetosiphon fregaeolii</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis craccivora</i>)		0,8 - 1,2	Aplicar al aparecer los primeros ejemplares o de acuerdo a monitoreo. Realizar hasta 2 aplicaciones durante la temporada, con intervalos de 15 días. Utilizar un mojamiento de 15-60 litros de agua/ha, utilizando volumen mayor para cultivos con mayor vigor. Usar las dosis mayores cuando exista presión media a alta de la plaga.

Precauciones para la aplicación aérea: No aplicar en condiciones de altas temperaturas (>25°C) o vientos fuertes (>15 km/hr) para evitar la deriva del producto fuera del área de aplicación.

Diazinon pertenece al grupo de los organofosforados, por lo que se sugiere se emplee un máximo de dos aplicaciones por temporada con productos pertenecientes a este grupo químico. Si la presión de las plagas persiste, se sugiere complementar estos tratamientos con otros plaguicidas de distintos grupos químicos, ya sean utilizados al control de adultos (vía foliar) o a larvas (vía riego o en aplicaciones al suelo). **Preparación de la mezcla:** Llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, diluir la cantidad necesaria de **DIAZOL® 50 EW**, hasta obtener una solución uniforme. Luego agregar el resto de agua completando el volumen deseado, manteniendo siempre el agitador funcionando. En aplicaciones vía riego, mantener pH neutro de la mezcla en el riego, de manera de procurar el efecto insecticida por al menos 3 semanas.

Compatibilidad: **DIAZOL® 50 EW**, es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas y fungicidas de uso común. En caso de dudas, efectuar previamente pruebas de compatibilidad. **Incompatibilidad:** **DIAZOL® 50 EW** es incompatible con productos con reacción fuertemente alcalina (cal, sulfuro de cal y sulfato cuprocálcico), y aquellos a base de cobre. **Fitotoxicidad:** No aplicar en nogales en su proceso de floración, ya que podría causar aborto floral. **Períodos de Carencia (Días):** Manzano, Peral, Membrillero (21 días); Almendro (45 días); Nogal (45 días); Ciruelo, Cerezo, Guindo (15 días); Durazno, Nectarino, Damasco (20 días); Vides y Parronales (50 días); Naranja, Limonero, Mandarino, Clementino, Pomelo, Tangelo (60 días); Brócoli, Repollo (7 días), Coliflor, Repollo Bruselas (21 días); Frutillas (15 días); Remolacha azucarera (14 días); Zanahoria (15 días); Alcachofa (40 días). Para los frutales con aplicación vía riego: carozos, vides, pomáceas, avellano europeo y arándanos no tienen carencia debido a la forma de aplicación del producto. **Tiempo de Reingreso:** No reingresar al área tratada antes de 12 horas después de realizada la aplicación. El período de resguardo propuesto para el ingreso a los sectores para animales de pastoreo es de 21 días. **DIAZOL® 50 EW** es marca registrada de Makhteshim Chemical Works Ltd.

