



Ficha Técnica Fungicidas

Almagor EC

ALMAGOR EC

INGREDIENTE ACTIVO

NOMBRE QUIMICO

Azoxistrobina, Prochloraz, Tebuconazol

*E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi) pirimidin-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato ** N-propil-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy) etil] imidazol-1-carboxamida *** (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol.

GRUPO QUIMICO

Azoxistrobina pertenece al grupo químico de los Metoxiacrilatos, Prochloraz pertenece al grupo químico de los Imidazoles y Tebuconazol pertenece al grupo químico de los Triazoles.

CONCENTRACION Y FORMULACION

5,6 % p/v + 20% p/v + 10% p/v

MODO DE ACCION

Sistémico y de contacto

FABRICANTE/ FORMULADOR

Adama Andina B.V. Sucursal Colombia

DISTRIBUIDOR EN CHILE

Adama Chile S.A.

TOXICIDAD

Grupo III Producto poco peligroso

LD 50 oral

Rata > 2000 mg/kg

LD 50 dermal

Rata: >2000 mg/kg

LC 50 inhalación

Rata: > 1.52 mg/l

(concentración analítica).

ANTIDOTO

No hay antídoto específico.

AUTORIZACION SAG N°

2878

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

ALMAGOR EC, es un fungicida sistémico y de contacto con acción preventiva, curativa y erradicante que combina la acción de los ingredientes activos Azoxistrobina, Prochloraz y Tebuconazol, actuando eficazmente en el control de enfermedades que se detallan en el cuadro de instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedades	Dosis (L/ ha)	Observaciones
Trigo	Polvillo estriado o Roya (<i>Puccinia striiformis</i>), Mancha foliar o Septoriosis de la hoja (<i>Mycosphaerella graminicola</i>), Anam.: (<i>Septoria tritici</i>)	1,0 - 1,2	Aplicar al detectarse la infección y con hoja bandera completamente desarrollada. Realizar 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 30 días. Utilizar la dosis mas alta frente a una alta presión de la enfermedad. Utilizar un volumen de aplicación de 200 - 400 L/ha.
Raps	Pie negro o Phoma (<i>Leptosphaeria maculans</i> Anam.: <i>Phoma lingam</i>)	0.8	Aplicar preferentemente en forma preventiva cuando el cultivo presente cuatro hojas o bien al detectar los primeros síntomas o signos de la enfermedad. Repetir si es necesario a los 30 días. Utilizar volumen de 150 - 200 L de agua/ha asegurando buen mojado y cubrimiento. Realizar máximo 2 aplicaciones durante el cultivo.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email

secretaria.cl@adama.com

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email sanfernando@adama.com



Ficha Técnica Fungicidas Almagor EC

APLICACIÓN AÉREA

Utilizar dosis por hectárea indicada en el cuadro de instrucciones de uso. Mojamiento 50 – 60 L de agua/ha, dependiendo del tamaño del cultivo, usar mojamiento mayor con un mayor tamaño del cultivo y utilizar el mojamiento menor a menor tamaño del cultivo.

PERIODO DE CARENCIA

Trigo (54 días), Raps (35 días).

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Para animales y personas, el tiempo de reingreso al área tratada es de 12 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

ALMAGOR EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común.

INCOMPATIBILIDAD

ALMAGOR EC es incompatible con productos de reacción alcalina o acida. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a una pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verter en el tanque de preparación la dosis a ocupar de **ALMAGOR EC** en la mitad del volumen de agua total a emplear manteniendo el agitador en marcha; revolver hasta lograr una emulsión homogénea, y finalmente rellenar con el agua faltante.

FITOTOXICIDAD

Según las recomendaciones de uso de esta etiqueta **ALMAGOR EC** no es fitotóxico.

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN PARA LAS ABEJAS

Se recomienda realizar las aplicaciones de **ALMAGOR EC** temprano en la mañana o al final del día, de manera de evitar presencia de abejas en el huerto durante la aplicación.

RETIRAR COLMENAS DEL AREA A TRATAR PREVIO A LA APLICACIÓN.

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email

secretaria.cl@adama.com

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email sanfernando@adama.com



Ficha Técnica Fungicidas

Almagor EC

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email secretaria.cl@adama.com

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email sanfernando@adama.com