



Ficha Técnica Fungicidas

Fungastop Sulfo

FUNGASTOP SULFO

INGREDIENTE ACTIVO

Extracto de naranja (*Citrus sinensis*)

Azufre

NOMBRE QUIMICO

Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico

GRUPO QUIMICO

Ácido cítrico pertenece al grupo químico de los ácidos carboxílicos y el azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.

CONCENTRACION Y FORMULACION

150 g/ Kg de extracto de naranja (equivalente a 0.18 g/ Kg de ácido cítrico)

790 g/ kg de azufre

MODO DE ACCION

contacto

FABRICANTE/ FORMULADOR

Quimetal Industrial S.A., Chile

DISTRIBUIDOR EN CHILE

Adama Chile S.A.

TOXICIDAD

Grupo IV. Productos que normalmente no ofrecen peligro

LD50 producto comercial:

dermal > 5000 mg/ kg (rata)

oral > 2000 mg/ kg (rata)

ANTIDOTO

No tiene antídoto específico. Tratamiento base.

AUTORIZACION SAG N°

2637

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

FUNGASTOP SULFO es un fungicida y bactericida natural de contacto, preventivo y curativo, recomendado para el control de Botrytis o pudrición gris del racimo (*Botrytis cinerea*); Oidio (*Uncinula necator*); y pudrición ácida, causada por el complejo de hongos como *Aspergillus niger*, *Penicillium expansum*, *Rhizopus stolonifer*, *Mucor sp*, *Cladosporium herbarum* y *Botrytis cinerea* en uva de mesa.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Enfermedades	Dosis (Kg/ ha)	Observaciones
Vides de mesa.	Botritis Pudrición ácida Oidio	18-23	Aplicar hasta 3 veces durante la temporada, iniciando las aplicaciones en pinta, repitiéndola 2 veces más hasta la cosecha, con intervalos de 10 días. Utilice la dosis menor en caso de baja incidencia de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas no sean favorables para su desarrollo. Utilice la dosis mayor en caso de ataques severos o cuando las condiciones climáticas sean altamente favorables para su desarrollo. Se recomienda emplear el producto en un programa de control en alternancia con otros fungicidas efectivos en el control de las enfermedades antes señaladas.

PERIODO DE CARENCIA (días)

FUNGASTOP SULFO no tiene restricciones de carencia.

TIEMPO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede utilizar la mezcla con productos formulados como polvo seco

PRECAUCIONES

FUNGASTOP SULFO debe ser aplicado temprano en la mañana o tarde durante el día evitando condiciones de viento muy fuerte. No aplicar con lluvia. Aplicar por espolvoreo, con máquina azufradora, distribuyéndolo en forma uniforme especialmente sobre los racimos. No se aplica con agua.

FUNGASTOP SULFO no es fitotóxico en los cultivos recomendados.

FUNGASTOP SULFO no es tóxico para peces, aves y abejas. Se debe evitar aplicar en mezcla con Difocol y Metomil. Asimismo, no se debe aplicar junto con productos de reacción alcalina y aceites insecticidas. No es recomendable su uso en condiciones de temperaturas altas. (30°C o más).

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504 Email secretaria.cl@adama.com

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541 | Email sanfernando@adama.com
adama.com/chile